

全  
幼  
心  
鑑

全幼心鑑卷之四

嘔吐

有物有聲名曰嘔乾嘔則無物有物無聲名曰吐有聲吐則無聲嘔吐出物也胃氣不和足陽明經胃脈絡陽明之氣下行則順今逆上行作嘔吐有胃寒胃熱痰水宿食氣攻之證有傷乳氣乳吐熱吐寒吐冷吐傷食吐傷寒吐各受病非一治法不同凡吐不問冷熱久吐不止胃虛生風恐成慢候嘔吐每每太便秘上下壅遏氣不流行當利導之藥治之微緩候胃氣將絕常嘔腥臭不保天年

小兒脾胃虛怯方作吐瀉其證有五有熱吐冷吐虛吐痰吐食吐所三熱吐者謂母飲酒喫肥炙煖醢鹹或冒風傷暑致熱兒

嘔乳入胃遂成熱吐冷吐者謂兒胃冷加以宿冷之物與兒即  
吐虛吐者其兒肌弱神困疳積未消胃堂又虛即吐痰吐者其  
兒胃氣本虛復感寒邪生痰作熱留滯胸膈故吐食吐者其兒  
胃弱飲食不節強食傷脾作熱神困吐後即愈酒家但知其吐  
不明其所以吐且吐無瀉其作名曰霍亂其吐候又推輕重有  
五初見乳自流出謂之哕哕之不已即謂之吐吐之不已則作  
嘔嘔之不已即傳逆逆之不已即作噦噦者自嘔噦噦皆有出  
噦動氣嘔者口開而作噦者心胸上下氣逆鬱結噦者無物可  
出即膈虛胃寒引氣噦噦作噦此等惡症須臾證變即慢胃風  
熱吐者先去風痰冷吐虛吐與生胃氣痞吐下却其痰次與正  
氣食吐且與塌氣豈可一槩理之吐瀉不止將虛風生張開風

驚眼合慢脾治之不當更下驚藥死不旋踵豈可得而救  
分長幼病察虛實有吐瀉三五日發風者有一日半日而發  
大抵女孩以吐爲急男以瀉爲速若氣虛暴瀉暴吐纔作便得  
之惟有疳瀉不成風候久則患無辜證終於虛乏矣但滯腸止  
瀉爲良吐即生胃爲正截風之藥加而用之凡驚藥及寒涼之  
藥切不可用亦不可用太熱藥其候乃屬陰證醫士載之勿妄  
爲幸

小兒嘔吐嘔逆噦有五嘔者謂嘔乳如視簷水射出吐者吐出  
有物嘔者開口而作噦者心胸上下氣逆鬱聚噦者無物可出  
皆緊切之證慢驚皆由此而作又須詳其冷熱虛實人傷所因  
胃寒即似氣吐面青唇白清涎夾涎吐出



熱吐即似驚吐有黃涎夾乳食乳成片頭額溫五心熱小便赤少或乾嘔噦無物夏秋間多有此證

虛吐肌弱神困不思乳食用生胃氣藥

痰吐即風壅吐咳嗽氣急或表熱

傷乳食吐即積滯吐吐作霍氣吐熱

蟲吐面白毛焦唇紅或紫或昏困不醒人事時吐又當於驚風內癰蟲痛及疳積門治之

鄭氏云但吐不瀉為逆吐而有痰發驚者危治之當斷乳但與稀粥食

熱吐者夏間多有小兒日中遊露伏暑熱毒入乳母出外感冒暑氣承熱便乳乳兒多成熱吐頭額溫五心熱小便赤中

暑之證當解暑退熱止嘔化痰五苓散用生薑煎湯調化不拘時候服香薷飲天水散皆清暑之藥

冷吐者冬月多有感冒風寒由乳母感受寒氣承寒便乳兒冷氣入兒胃中嘔吐喜熱惡寒四肢蜷清寒吐必夾清涎吐出以溫中藥服丁香圓霍香正氣散加丁香四君子湯加丁香陳皮去白乾薑炮生薑棗去核同煎食前服寒極者理中湯加附子炮去皮尖鹽量虛實治之

傷食吐酸臭夾乳食而出惡食胃脘身發潮熱有下證下之有食積宿滯者服消積圓鶴頂丹無宿滯者下之後服消食圓長生圓治之

傷乳吐乳食過飽滿而必溢導虛胃氣久吐不止慢驚自此而

得乳母服沉香降氣湯兒服助胃膏調中湯大醒脾散治之  
氣乳吐乳母憂思忿怒之氣食乳乳兒乳隨上不能克化故嘔  
兒吐乳母同服沉香降氣湯  
傷寒吐傷寒傳裏裏氣上逆半表半裏之證多嘔有胃氣熱乘  
虛入胃胃得熱則氣逆嘔

### 吐奶說

小兒吐奶有數般或是風疾所致則其吐不可止也吐奶更夾  
痰繞吐却即主風若止却後其風無止處更入外風則朝心閉  
胃管後變驚風胃主四肢被痰涎閉却即搐心主神被外部所  
干即驚神不定故變驚風也故止住吐即驚風發手足搐搦口  
舌紅赤張口而喘雖多名藥亦不能救療爾

小兒吐奶鼻青客傷風肺夜間煩燥身上發熱

小兒吐奶唇黑多哭是傷脾須夾痰也

小兒吐奶身熱其奶成片子者是胃有熱積久則生風

小兒吐奶不化夾清水是胃冷其人必面青唇白是也

小兒吐奶早晚發熱則足驚吐而不睡是也

小兒翻吐候 摘搦氣張蘇 此病難醫療 其名號胃虛

氣逆胃家冷 氣細急風生 急取為妙手 調脾是術精

乳吐停胸膈 生痰作吐頻 不宜尿壅澀 尤忌燥紅唇

現乳候嘔奶曰現

顛腦動不停 常聞有吐腥 碧壘眼上膜 汗出脚如冰

其證胃虛多現奶眼碧膜心受驚風氣不順顛腦動及多

汗胃氣虛冷致成此病

吐奶胃氣實 胃滿生吐逆 吐多有風生 驚風因此得

吐罷腦後溫 吐乳無變色 先須定却氣 隨後除風疾

面青唇白胃曾驚 吐奶黃痰冷熱并 乳食不通乾嘔逆

調脾利膈立惺惺

小兒吐奶嘔逆候脾氣不順胃氣結冷也用調胃補虛若生風

氣壅用藥止吐瀉

奶乳從來胃來實 奶滿胸高生吐逆 吐多遍體有風生

驚邪皆爲如斯得 吐定須更腦後溫 吐出奶來無變色

先宜定氣又除風 急早求醫尋妙訣

時時顛倒動無停 奶乳常聞氣又腥 碧色眼睛如上膜

更看汗出脚如冰 若遇氣細胃家冷 氣若龜時是急驚

胃冷調和方是妙 是風急取見須明

嘔乳生涎

嘔乳非爲吉 生涎其可疑 闕睛防掣搐 咂口必驚危

時時吐唾 服地黃圓

時時頻吐唾 腎氣冷之因 日漸亡津液 萎黃作瘦人

吐乳發搐 惡候

吐乳頻頻必發驚 脾虛困弱失精神 精神既失涎潮壅

顛腫青筋不救因 顛陷亦同

壅乳生吐 惡候

孩兒何嘔逆 壅乳爲傷脾 解脫因風冷 頻頻吐不宜

素問二食則嘔者物盛滿而上溢巢氏云小兒吐哕者乳  
甫冷熱不調則停胸膈因哺乳前後相觸氣不宣流故令  
見吐哕也

五苓散 治嬰孩小兒霍亂吐瀉煩渴飲水虛熱加黃耆蜜炙  
人參二錢

猪苓 去黑皮

白朮

赤茯苓

去皮各五錢

澤瀉 七錢半

桂 去皮二錢半

右爲極細末用生薑煎湯調化不拘時候服

香薷飲

治嬰孩小兒臟腑冷熱不調飲食不節霍亂氣逆有

心痛而先吐有腹痛而利者有發熱頭疼寒痛而腹吐利虛煩

或嘔無物四肢逆冷脉欲絕煩悶昏塞而欲死

白扁豆

炒去皮二兩厚不薑汁製炒四兩

香薷

八兩

黃連

炒一兩五錢

右剉散用水煎不拘時候服

益元散

一名天水散

滑石

水飛

甘草

炙各七錢半

右為極細末用滾白湯入蜜少許吐不止者薑汁調化不拘

時候服

丁香圓

治嬰孩小兒嘔吐不止

丁香

半夏

去皮麝生各一錢

右用生薑汁次一宿晒乾為極細末生薑汁煮麪糊圓如黍米大用生薑煎湯食遠服



沉香散

治嬰孩小兒補虛調胃氣止吐瀉進乳食

沉香 一分

丁香

甘草炙

霍香葉

各一錢

木香

桂

各半錢

茯苓

一分

右爲極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

理中湯加丁香 木香

四君子湯加丁香

陳皮

去白

乾薑

炮

右以生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

定吐紫金核

治嬰孩小兒嘔吐不止

人參

去熱

白朮

藿香葉

半夏

木香

丁香 各二錢半

石為極細末煮麪糊圓如茶  
末一錢同為衣陰乾棗一箇  
熟嚼化服後用米飲壓之

朱沉煎 治嬰孩小兒嘔吐不止

朱砂 水飛一錢 霍香 水三錢 滑石 水飛一錢

丁香 十四箇 沉香 一錢

右為極細末用新汲水一小  
須臾墜下濾去水却用別水  
化令勻前服

益中膏 治嬰孩小兒嘔吐泄  
瀉脾虛不食肚腹脹疼因倦

丁香 肉豆 治男婦去油各二錢

縮砂 去殼一錢 訶子 炮去核 甘草

青皮 去穢炒各五錢

陳皮 去白一兩

不為極細末煉白蜜圓如芡 貫大用滾白湯研化食前服不

思乳食大便米穀不化夜起者日進二服

左薑散 治嬰孩小兒脾胃虛弱腹瀉泄痢不思乳食嘔吐不

止困乏神懶心脇膨脹顏色青黃微厥不醒

丁香 二錢 陳皮 去白一兩 甘草炙

青皮 去穢炒各二錢 訶子 炮去核五錢

加肉豆蔻 麩裹煨去面 二錢半

右為極細末用生薑棗去核 同煎湯調化食前服

沉香降氣湯

香附子 炒一兩五錢

沉香 一錢

甘草炙 錢 煨砂去殼五錢

右為總細末用鹽燒過餅湯調化食遠服

檳榔圓 治嬰孩小兒疳積聚腹脹食積傷食嘔吐瀉

檳榔去穢 一二錢 蓬莖木 煨

青皮去穢炒 煨砂去殼各四錢 木香 三錢

史君子去穢 煨砂去殼各四錢

黃連炒二錢 山果球去核六錢

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食前服腹痛加桂

一錢

八白散 治嬰孩小兒脾胃虛弱風痰水穀入口嘔噦發熱氣

乏飲食不下霍亂吐利心膈膨滿中脘不和神精恍惚

全何本藥

沉香

藿香葉

人參去蘆

草薢去殼

乾薑炮

半夏麩

片藥炒

檳榔去膚

白豆蔻去殼

茯苓去皮

白朮

白豆蔻炒去皮

白芷各一錢

右為極細末生薑葉去核同煎湯調化食前服瀉後復吐或

吐後復瀉

人參溫中圓 治嬰孩小兒驚吐熱吐心神悶亂中脘不和漸

加恐悸恍惚無定

人參去蘆

白朮

茯苓去皮

半夏麩

陳皮去白

肉豆蔻麩炒去油

右爲極細末黃肉去核圓如黍米太霍香葉生薑同煎湯不  
拘時候服

調中正胃散 治嬰孩小兒中脘不和胃氣不止胃冷傷熱吐  
逆煩悶困力乏飲食不進虛弱思睡睡不安穩

藿香葉

白朮

人參去蘆

茯苓去皮

甘草炙

陳皮去白

山藥

白扁豆

炒去皮

半夏麴

乾薑炮各一錢

右坐散用生薑二片棗一箇去核同煎不拘時候服

紫蘇子飲 治嬰孩小兒飲乳母氣妳嘔吐

紫蘇子

人參去蘆

沉香各二錢

甘草炙一錢半 縮砂去殼二錢 茯苓去皮四錢

右爲極細末用生薑煎湯調化食前服

泄瀉

胃爲水穀之海其精英流布以養五臟其糟粕傳送以歸大腸  
內由傷胃虛冷乳食積滯外因感冒寒熱所傷遂成瀉痢傷風  
自汗惡風者痛引腰脊鼻塞壅強夾寒者筋節拘急面慘惡寒  
傷暑面垢煩燥渴飲水漿背脊自汗傷濕者肌肉虛浮身痛重  
著冷者則腸鳴吐冷手足清熱則煩燥身熱而手足溫冷熱不  
調者乍澀乍溏熱積於內者不能去其積徒以冷藥冰之熱氣  
無所發泄冷熱相搏而下注此冷積於中不能去其滯徒以熱  
藥壓之冷積不能宣通故冷熱相干而成泄外則傷食一證失

飢傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭夜熱晝涼泄者若脾胃  
合氣以消水穀水穀既分久有所謂脾恙而泄也

治法究以受病之源宜用此證之藥吐瀉暴作暴爲急證蓋脾  
虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐瀉並作吐瀉不止必傳慢驚慢  
脾風也是陽明胃經以養三筋暴吐暴瀉津液驟之失其所養  
則轉筋入腹而死

大要散風邪消積滯開胃進食養脾之藥惟傷食泄瀉者必惡  
食發熱心腹脹痛下酸臭先以疎利其食服消積圓鶴頂丹微  
疎導不可峻取後消食藥治之

食積泄瀉者積聚停飲痞膈中滿肋脇疼痛夜熱晝涼口吐酸  
水嘔逆注瀉赤實者先利而後補服消積圓鶴頂丹下後服消



導藥虛者元補而後下

暴吐瀉者脾胃俱虛參朮散加丁香生薑棗去核同煎服以正胃氣

傷風泄瀉者脾臟虛怯也當補脾脾實者先解風熱服藿香散風熱已退微熱者參朮散加圓子脾虛者先實脾後發散服醒脾散實脾散

假令春月間多有傷風咳嗽泄瀉者表裏俱虛服藿香正氣散倍加茯苓去皮白朮生薑棗去核同煎痰嗽發熱微瀉者服人參羌活散加半夏麴同煎後加味四君子湯參朮散止瀉治之夏月傷暑泄瀉者其證面垢煩燥作渴飲水漿頭熱嘔吐泄瀉服丁香圓定吐紫金核先定吐後參朮散發熱煩渴不止者參

木散如天本散治瀉食滯調任意服其功圓單水瀉不止者服玉華丹治之

秋月痰嗽泄瀉者服六和治之

冬月感寒泄瀉者助胃膏益黃散加肉豆蔻生薑棗去核同煎服寒極者附子理中湯吐瀉脾胃俱虛欲作慢驚服烏蝎四君子湯佐薑棗去核同煎服或唯脾散全蝎觀音散治之

中濕泄瀉者著冷腸鳴肚腹痠手足寒服理中湯大養脾圓薑杏正氣散腹痛加桂乾薑伏暑者加香薷寒暑同用

錢氏治傷寒泄瀉者泄止而後後瀉乃脾間有風不能發泄泄也而又泄用宣風散宣去脾間風然後止瀉

夏月伏暑吐瀉者乳母觸冒暑熱熱乳乳兒及小兒日中遊戲

受熱成疾便爲霍亂吐瀉爲中滿瘧疾大渴腹脹下痢諸熱病  
疾因暑得之其根未除難收其效傷暑證似傷寒但若能消氣  
氣消則脉散虛而無力六脉沉浮微弱

其證面垢昏倦毛聳惡寒吐痢煩燥渴其壯身熱頭痛四  
肢厥冷身軀無痛當解毒毒後發散表不解暑定傳瘧疾  
日久難瘥

治證服五苓散生薑煎湯調服天水散發解暑瀉不止者玉華  
丹煩渴不止者參朮散合天水散滾白湯調任食前服

中暑昏沉不醒黃連香薷散加羌活煎服調天水散異功圓抱  
龍圓治之逆搖吐瀉交作喘而不治

古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚

小兒患吐瀉女壯男瀉最爲急證吐瀉不止脾虛風生急治  
五月二十五日夏至之後吐瀉身壯熱此熱也小兒臟腑十分  
中九分熱也或因陽熱乳食不消瀉深黃色服王露散  
六月十五日大暑後吐瀉身溫似熱臟腑六分熱四分冷也吐  
嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃  
散食後多服王露散

七月七日立秋後七日吐瀉身溫涼三分熱七分冷也不能食  
乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噤欲入便不渴食  
前多服益黃散食後少服王露散

八月十五日秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾噤瀉青褐  
水服益黃散不可下吐乳

吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下

虛羸脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後脾胃尚弱不能傳化穀氣有冷者時時下利唇口青白有熱者溫壯身熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香圓夏月不可服如有證則少服

小兒臟寒腑冷大腸不禁認謂之瀉分別輕重究竟緩速有澹有泄有滑有利有洞五者不同豈可一柴而埋之澹者糟粕不聚由其尚濃似瀉非瀉泄者無時而作或出不知利者直射濺溜氣從中皖滑者穀食直過腸胃不化洞者頓然下之如桶散潰餘更不留即知其兒臟寒腑冷瀉之作疾其來緩速輕重可知凡兒瀉糞出青色者急脾寒命危經所謂肝屬乙木能克己土

所勝之功故現本實由其臟之虛寒非謂驚也又瀉初黃良父  
變書云乃臟寒之微又瀉藥物自過尤爲寒滑凡虛滑三五次  
則寒之若不急與溫其臟調其胃平順三焦和正榮衛不爾則  
慢驚證候傳變如此之意欲以止瀉藥次第理之往往不及惟  
務溫其臟腑臟腑既溫其何能留於腸胃之間或以熱藥頓止  
則熱又爲它疾須先投婦腸藥然後生胃正氣與服切不可意  
急過劑投之熱藥稍或臟腑至虛寒孩童用之因收厥冷者是  
謂逆證用附子白朮乾薑量輕重而用凡投熱藥瀉止卽刺作  
無疑理瀉良方已著在後請意度之爲得妙矣

瀉之證不同唐泄滑利洞也瀉者糟粕不聚似瀉非瀉世者無  
時而作或不知出利者直射濺溜氣從中脫滑者水穀直過腸

胃不化洞者頻然下如桶散漬不留各脾胃之不調也熱瀉大  
便必黃赤或有沫糞射出遠先用五苓散分其水數部平胃氣  
脾虛受冷面青唇白眼輪黑糞或青或白手足冷不溫調其脾  
必傳慢驚疳暴瀉糞臭如寡雞子腹膨時或一瀉不效紫身熱  
發實可下之却調胃傷食瀉肚膨熱是冷瀉發熱是此瀉補不  
止宜下却補脾若肚弱田中消積脾藥却暖補驚瀉糞青夜啼或  
時驚悸參苓白朮散四君子湯加茯神蓮肉有食積者治上能  
令黃瘦子頰作化生兒半服五積圓微利其積後服三棱圓  
夫大便青者臟冷也或初出微黃良久則青者亦然也靈秘云  
瀉下如藍澱胎中受積驚驚心受驚心主驚心驚則膽怯膽者  
與肝爲表裏也膽怯則肝冷肝傳脾脾受邪故大便初中微黃

脾之本色黃又復青肝之本色也肝熱則外發自赤肝冷則內  
作便青又有不因驚而得此證者蓋胎氣怯弱內受風寒故  
也有便青夾白濃稠粘如涎者亦是腸寒久則令兒面白形青  
腹痛驚啼失治則變陰瀉也

吐瀉

初生三日內吐瀉壯熱不思乳大便乳食不消或白色是傷  
食常利之後紅胃用益黃散治之

初生三日已上至十日吐瀉身無涼不思乳食大便青白色乳  
食不消此上實下虛更有無見證

肺旺露睛喘氣心驚悸飲水脾困倦饒睡肝呵欠頻悶

腎不語畏明當瀉一作見見臟補脾一作散治之此二證多



病於夏秋也

生下吐初生下拭掠兒口中穢惡不盡咽入喉中故吐木瓜  
王之初生急須拭掠口中令其不啼穀發則嘔下多生諸病  
傷風吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣麤大便秘黃白色嘔吐乳食不  
消咳嗽更有五臟兼見證當取入臟君臣藥先大青膏後服益  
黃散如先曾下或無下證慎不可下也此乃脾肺受寒不能入  
食也

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便秘黃水此爲胃  
虛熱渴吐瀉當生胃中津液不止其渴止後用發藥止渴多服  
白朮散發散大青膏

便黃因內熱

紅赤黑同看

綠白青皆冷

疳肥食臭酸

久瀉四肢癱 緣驚睡不安 熱疳毛作穗 涎沫定驚寒  
肝瀉膨脹腹 肌膚日漸乾 脾虛難化食 腸滑久經瀉  
寒熱多腥臭 頭垂腫四肢 唇紅因渴熱 進退極難醫  
肝冷傳脾臭綠青 焦黃脾土熱之形 肺腸寒色膿結白  
亦熱則心腎熱成

小兒洩瀉精神少 久患照虛食不聞 碧綠眼睛生白膜  
青黃面臉見紅筋 有時極鼻鼻眉額 或即臺唇擦齒齦  
渴飲停留脾受濕 至今水飲不能分  
毛乾唇白額頭筋 定是疳多積與驚 肚脹有瘰癧子樣  
瀉如糟粕色黃形 其將熱與他服 止住腸中便作鳴  
忽若渴生身熱熱 候人虛汗又風生

只緣積熱傷脾後 致使終日瀉不休 項軟見人多噎氣  
更兼清水鼻中流 少時一二深黃色 多努腸頭出不休  
形候只看胸膈上 胸紅定自汗通流 眼如赤脈終難理  
唇赤生瘡命定休 用藥先溫脾胃內 次醫餘瀉是源由

身熱發厥 久瀉利多虛熱

氣虛多發厥 血虛須作熱 氣血若俱虛 身熱手足厥  
洩而腹脹脉弦者死 腹大而洩脉微細而澁者生 緊大而滑  
者死 洩注脉緩微小者生 浮大數者死 注下脉細者可治  
浮大者劇 洞洩食不化下膿 血脉微小者生 緊急者死  
助胃膏 治嬰孩小兒胃氣虛弱 飲食不進 腹脇脹滿 腸鳴泄  
瀉 乳便青夜啼 臨寒腹痛

白豆蔻 去殼

肉豆蔻 麩炒 丁香

人參 去蘆

木香 各五錢

茯苓 去皮

甘草 炙

白朮

桂 去支

藿香葉

縮砂 去殼各一兩

陳皮 去白

山藥 炒各二兩

加沉香 二錢

右為極細末煉白蜜圓如大實大用木瓜煎湯或米飲研化

食前服

助胃膏

治嬰孩小兒慢驚風吐瀉不進乳食

人參 去蘆

白朮

蓮肉 去心各二錢

白豆蔻 去殼

甘草 炙

茴香 炒

丁香

檀香

木香 各一錢

右為極細末煮粟米糊圓如芡實大用陳米飲研化食前服

脾困不醒用冬瓜仁炒煎湯服

助胃膏 治嬰孩小兒助養脾止吐

人參 去蘆

白朮

茯苓 去皮

縮砂 去殼

山藥

甘草 各各三錢

沉香

木香 各一錢

丁香 五粒

肉豆蔻

與養嬰去油

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用生薑煎湯研化食前服

寧胃膏

治嬰孩小兒脾虛胃弱泄瀉不止

人參 去蘆

白朮

茯苓 去皮

甘草

肉豆蔻

與養嬰去油

白豆蔻 去殼

草豆蔻

去皮

陳皮

枇杷葉

去毛

青皮

去穢炒

丁香

沉香

木香

藿香葉

縮砂

各一錢

右爲極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

養脾圓

治嬰孩小兒脾虛泄瀉

白朮

茯苓

去皮

乾薑

炮

黃連

炒

肉豆蔻

麩炒

木香

各一錢

右爲極細末煮麵糊圓如黍米大用燈薪糯米同煎湯不拍

時候服

藿香正氣散

治嬰孩小兒傷寒頭痛增寒壯熱痰喘咳嗽心

腹疼痛吐瀉虛腫疳積

藿香葉 七錢半

甘草 炙六錢

腹皮

白芷

紫蘇

茯苓

去皮各二錢半

半夏麴

白朮

陳皮

去白

桔梗 去蘆炒

厚朴

薑製炒各五錢

右咬咀用生薑三片煎一箇去核同煎不拘時候服

不換金正氣散 治諸孩小兒四時傷寒五臟氣噎咳嗽痰涎

霍亂吐瀉臟腑虛寒 痢赤白

藿香葉

厚朴

薑製炒各

甘草

炙一錢半

蒼朮

米泔浸

人參

去蘆

茯苓

去皮

木香

各一錢

半夏麴

三錢

陳皮

二錢

右咬咀用生薑

二片煎一箇去核同煎服

參苓白朮散 治小兒脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄瀉

藥中和不熱久服養脾胃止瀉痢

蓮肉 去心

薏苡仁

縮砂 去殼

桔梗 炒各五錢 茯苓 去皮

甘草 炙

白朮 各二兩

白扁豆 生薑汁浸去皮 炒一兩二錢半

山藥 一兩一錢

右為極細末用棗去核煎湯調化食前服禁口痢加石菖蒲

五錢半薑棗去核煎服

藿香散 治嬰孩小兒脾胃虛弱乳食不調身熱風熱作驚吐

瀉不止

藿香葉

人參 去蘆

茯苓 去皮



丁香

差活去蘆

防風去蘆又

半夏麴

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食遠服

肉豆蔻圓

治嬰孩小兒嘔吐泄瀉

木香

縮砂去殼各

赤石脂七錢半

礬

煨七錢半

龍骨

訶子煨去核

肉豆蔻

麴裹煨去油各五錢

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食前服

沉香豆蔻圓

治嬰孩小兒乳哺失宜冷熱不調熱衝上臍冷

歸下焦虛實不等水穀不化遂傷脾胃胃虛則嘔吐脾虛則泄

利夾積變為下痢膿血善治常脾胃更在調適也

沉香

芍藥炒

人參去蘆

蓬莪木煨

縮砂去殼各三錢

當歸去蘆炒

肉豆蔻剉去油

白朮各二錢半

右為極細末蒸餅圓如黍小大用米飲食前服

固腸散 治嬰孩小兒嘔吐泄瀉不止

人參去蘆

白朮

茯苓去皮

甘草炙

訶丁煨去核

木香

肉豆蔻剉去油

藿香葉

縮砂去殼各一錢

右剉散用水煎食前服

桂苓白朮散 治嬰孩小兒

瀉驚風冒暑濕熱轉筋腹痛

桂去皮

茯苓去皮

白朮各二錢半

甘草炙

澤

石膏

寒水石

各五錢滑

一兩

右為極細末用生薑煎湯

化食前服

桂苓甘露飲

治嬰孩小兒

液咳多嗽調臟腑寒熱嘔吐流濕

閉燥遍身氣逆水腫泄瀉不

桂去皮

人參

去蘆

藿香葉各二錢半

茯苓去皮

白朮

甘草炙

葛根

石膏

寒水石

澤瀉各五錢

木

一分二錢半

滑石一錢

右為極細末用生薑煎湯

滾

日湯調化食前服

麥素散

治嬰孩小兒霍亂

瀉

肉豆蔻去油 麝香去油 陳皮去白 附子去黑

半夏麩 青皮去穢炒 木八

甘草炙 五錢 石菖蒲二錢

右以咀用生薑三片紫蘇三葉同煎不拘時候服

開胃圓 治嬰孩小兒臟腑怯弱內受風冷腹脇脹滿腸鳴瀉

利青乳食不化臟冷夜啼胎寒腹痛

木香 蓬萊木煨 當歸去蘆炒

人參去蘆 白朮各五錢 芍藥炒

麝香各一分

右為極細末煉白蜜圓如其實大用米飲研化食前服

乳豆圓 治嬰孩小兒泄瀉

乳香二錢半 肉豆蔻切片五錢

右用生薑五片同炒黑色只存乳香肉豆蔻二味研細成膏  
旋圓如黍米大用米飲食前服

玉華丹 治嬰孩小兒伏暑泄瀉驚搐

淨瓦盆合定出火煨過八兩

右爲極細末真醋麴糊圓如黍米大用木瓜煎湯食前服

白龍圓 治嬰孩小兒泄瀉不止

白石脂 龍骨各二錢半

右爲極細末滴水圓如黍米大每三圓用紫蘇木瓜煎湯食  
前服

白龍圓 治嬰孩小兒中暑泄瀉不止

舶上硫黃

煅

同炒成膏

滑石

煅各五錢

右為極細末用飛羅麵煮糯米大用六分煎湯或倒流水食前服

白龍圓

治嬰孩小兒吐瀉不定滑泄注水小便少

附子

炮去麻

白石脂煅

龍骨

煅各二錢半

右為極細末醋煮麵糊圓如黍米大用米飲食前服一方加

礬煅二錢半

參朮散

治嬰孩小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯

竭煩渴多燥但欲飲水乳食不進羸困乏力因而失治變成風

癰不問陰陽虛實

人參去蘆

白朮

木香

茯苓去皮

藿香葉拂去土

甘草炙各一錢

白根炒二錢

右剉散用生薑三片棗一個去核同煎食前服

伏暑煩渴加益元散用白湯調服吐瀉加丁香黃耆蜜炙白

扁豆炒去皮各一錢

寒水散 治嬰孩小兒吐瀉亡津液煩渴心燥進乳食

人參去蘆

白朮

茯苓去皮

山藥

白扁豆炒去皮 葛根炒

藿香葉

丁香

訶子炮去核

甘草炙

石為極細末用生薑煎去核煎湯調化食前服

大安圓 治嬰孩小兒吐瀉不止

木香

芍藥

人參

白朮

茯苓

訶子

厚朴

陳皮

去白各半錢

石為極細末煉白蜜圓如芡實人用米飲研化食前服

調中散

治嬰孩小兒瀉瀉傷食瀉

香附子

甘草

茯苓

天仙藤

藿香葉

芍藥

葛根

石為極細末用烏梅去核甘草煎湯調化食前服



六神散

治嬰孩小兒脾虛胃弱吐瀉不進乳食

人參去蘆

白朮

山藥炒各五錢

甘草炙二錢

白扁豆炒去皮

茯苓去皮各一兩

石爲極細末用生薑煮去核煎湯調化食前服發搐加天麻更不止加水香

妙香圓 治嬰孩小兒水瀉不止上吐下瀉飲食對過瀉出肚熱煩渴頭額有汗不進乳食

木香

黃連炒

枳殼煨

五倍子各半錢

石榴皮

穿山甲

煨各一錢

右爲極細末煮麵糊圓如黍米大用陳米飲或丁香一粒藿香二葉同煎湯食前服

藥膳豆豉

治小兒腸胃虛弱積滯不聚瀉痢不止或

赤白冷熱不調日夜頻併愈而又發

肉品裝箱 易爛去油 一箇

胡粉炒二錢

龍骨生

每瓶各一錢

右爲極細末用米飲調化不拘時候服

木香圓

治嬰孩小兒脾胃冷瘦疳

木香

青黛

檳榔去腐

白口莊

半去  
錢般  
各

麝香一字

續隨子二錢

蝦餅燒竹廿二錢

一、金龜殼末煉白蜜圓如芡實大用薄荷煎湯研化食前服

玉露散

治嬰孩小兒傷寒吐瀉黃色

寒水石五錢 石膏五錢 甘草生二錢半

右為極細末用滾白湯調化食後服

沉香散 治嬰孩小兒補虛調胃氣治吐止瀉進乳食

沉香 茯苓去皮各二錢半 木香

桂去皮各半錢 藿香葉 甘草炙

丁香各一分

右為極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

溫白圓 治嬰孩小兒久瀉脾虛不進飲食訖仍前瀉下米食不化

白木末二錢半 半夏麴一錢半 丁香炒半錢

右為極細末生薑汁煮麴糊圓如黍米大用淡生薑煎湯食

前服

木水圓

治嬰孩小兒嘔吐

木水末

錢

木水末

錢

木各一字

賦粉

石為極細末煮麵糊圓如

米大每二圓用甘草水不拘

時候服

痢

凡春傷於風因衣暖解脫

新風冷所傷藏於肌肉吐反因飲

其居處不調又彼風冷乘之

以入腸胃先輕後重則下痢也其

冷盛則頻下痢液亦白赤

熱乘於血而滲大腸則赤也若風

亦夾熱則所下黃而赤

為損腸胃則精液凝滯則白也若

寒邪併之則所下白而清熱相交故赤白相半重者壯若膿  
涕而雜之輕者白濁中間或有赤縷內夾風邪故清血流注溫  
毒入腸胃之間則下如豆或成痼血也

治法大要風邪行滯氣  
積滯解暑毒開胃進食為先初得  
痢者便不可用肉豆蔻罌  
邪氣得補心懸風邪積滯  
痢出於積滯積物積也滯  
下墜裏急後重乍起乍止  
當先未用通利之藥疎其  
隨證治之

其病感冒寒者食淡熱者  
冷物食飢傷飽不能開緩皆成五泄

大素曰五泄者有溇泄水泄飧泄濡泄滑泄此五泄者感肝木之象其色青赤者受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣其色白黃者脾土之氣其色黃黑者得北方土之氣平與水隨之其色蒼黃併發痛而不愈諸藥不止者須下服導滯散小續柳微利之開除濕熱者毒病閉積滯而使氣液宣通以腸胃虛冷乳食積滯外感風寒暑濕所傷遂成瀉痢傷風者自汗惡風身寒感寒者回陽虛浮停積者夜熱晝涼乍瀉乍澹冷痢者內脾虛胃冷食啖食物停滯下青白成凍赤白赤者熱也白者冷也久痢者腸胃久虛脾胃滑泄不止休息痢腸胃虛寒腸鳴不禁日夜頻併無度各受病不同用藥難收其效有積者服消積圓太乙圓或水沉

丹駐車圓先疎止積滯痢漸減疎服阿膠梅連圓或黃連阿膠  
圓感風邪發熱服人參散散加蓮肉去心粳米煎服停寒服  
痢腹中滿加茯苓厚朴生薑云核同煎服水煮木香圓中濕  
者不換金正氣散加木香人參赤茯苓生薑棗云核同煎服感  
冒者毒五苓散入車前子八天用米飲食前調服黃連阿膠圓  
香連圓久痢休息痢者脾久虛不禁服大養脾圓真人養臟  
湯助胃膏水煮木香圓赤痢者熱散大勝下赤痢發熱服芍藥  
甘草湯白水煎服後服芍藥和皮圓白者腹中結痛身痛厥逆  
表裏俱虛理中湯寒極者加附子赤白痢者冷熱不調下痢亦  
白和雜服胃風湯小兒車前傷人下痢夜熱晝涼氣急發渴  
日飽腫脹肚硬下痢赤白腦酸臭惡食此痢亦不可更補紫

圓子消積圓子後服褐圓子加炒黃連能消食止痢開胃進食  
有積者用巴豆大黃氣用枳殼桔梗青皮蓬莪木佐黃連阿膠  
大腸要藥有熱毒則能疎導無熱毒則安阿膠圓當歸青皮赤  
茯苓黃連阿膠炒作劑入烏梅蜜同煎服最能將惡積若止則  
止積滯既去痢漸減疎有熱去熱無熱則安用木香茯苓縮砂  
白豆蔻甘草和脾進食

治痢主量助胃為陽本助胃為陰平調陰陽蜜治痢生薑作片  
煎茶各一錢半蜜水煎服蟲毒痢阿膠黃蘗各二錢用水同煎

服

痢疾不能飲食邪氣疫毒不能發泄傳入臟腑腸胃折疊以禁  
口九死一生脾虛胃弱有熱氣開閉胸中禁口服參苓白朮散



小兒積穀穀米一撮同煎食前服心氣一通而便能食  
入痢者皆因八邪而生也寒者熱不勻風邪入臟則爲痢  
也熱則赤冷痢則白冷熱相加則變赤白色食痢則酸臭驚  
痢則青膿痢則臭食不消化時行痢則有血痔痢是膿瀉不時  
此是八痢也

小兒八痢曰冷曰熱曰疳曰驚曰冷熱不調曰休息曰膿痢曰  
蟲毒諸痢無積不能成冷痢白積積熱痢赤積冷熱不調積下  
赤白疳痢黃白積下無時度痛痢青積休息痢黃黑如魚腸痢  
而復作膿痢皆積而又下肚大飲食不爲肌膚黃黑大便膿  
赤痛啼叫蟲毒痢上紫黑不可不詳察略方藥斟酌用之  
小兒久痢渴思酒時時欲飲者是腸胃精液枯竭也諸書不

曾說累經有效素問云陽痿便血身熱則死寒者生陽痿下痢  
白沫脉沉者生浮大者死大奇論云熱在七日死陽痿下痢血  
而熱者是火氣內絕去心歸於外故死火受制故七日死凡痢  
如癰中膿者多死久痢舌黑者死聖惠方云久痢脉沉腹痛者  
死久痢身熱汗出者死

痢者利也痢之爲積無積不成及至積化成痢且脾胃亦虛即  
不可更下善痢者生其胃溫其脾胃其腸和其濕無不愈也若  
成痢疾故不可下下之反虛作渴浮腫痞滿脹急不食亦不可  
便補補則傷熱能令脫肛不收先與禁部一切毒食之物類與  
生胃急即與厚腸胃服此痢即通和順氣溫臟腑或純白者乃  
積冷毒加之即與揆去其毒却與溫其脾胃其痢自止痢疾能

飲食可以治之妙藥調理無不癒愈稍失胃氣不能飲食疾不  
禁口有不食至死又有毒蕪傷胃口亦不飯食或患痢疾因食  
物毒不見腸頭鮮血頻滴或面黃大深黑可畏腹肚疼痛裏急  
後重名曰刮腸日夜頻併無食直過名曰滑腸此二種痢最爲  
惡候乃是一十二種中皆然傳受而作此候也言小兒美飲食  
者飲謂飲乳食謂食飯若諸軍能飲水漿喜食菓子魚物之類  
者亦助其虛不能令臟腑實須是白粽子爛煮飯可矣若以  
極糯極粘膩不堪脾胃之病猶其增困幼者啣乳克化漸安去  
穢平和六腑調貼然後陰陽自均氣脉自壯固最湯劑不以抑  
之或有餘毒宜以順調緩治不可攻繫又有時氣作痢黃者相  
染而成乃由天氣時雨不正陰清濕之氣冷熱相干腸胃糟粕不

聚遂成其疾腹肚疔痛要急復重化膿實治者宜服木香散  
地榆當歸芍藥因是寇石驚極細末蒸烏梅肉圓如赤米人用  
東去核煎湯食前服神功已法也

叔和歌曰濕多成五泄勝去若雷奔下痢微小却爲主脉大  
汗共無聲日身寒則生身熱則死

痢後眉頭皺唇青兩臉青渴來唇帶赤盛熱眼朦朧

多因諸毒乳積於胃腸中日久傳成瀉如膠夾白紅

頻啼并刺痛似凍或垂膿此爲諸痢證早治莫從容

小兒下痢有多般不可誤來一例看冷痢有時青與白

熱多黃赤糞成團熱侵絡爲鮮血壅毒纏傷似紫肝

公執相交紅白雜或成青黑或成丹

白痢 先傷冷積在胃 故發渴而土寒出也

痢光發渴要湯水 面上 露汗出光 騰騰眼慢常如睡

腹內緣如刀刃傷 努出 八腸多發痛 不思飲食面痿黃

髮焦眼碧耳雙冷髮焦耳冷是 變色三朝必定亡先取

積次治痢止痛又  
瀉氣方思飲食

赤痢

欲知赤痢眼無開 定是 盲食熱藥來 唇白舌紺瘡滿口

一時須去十餘圓 腹中 利痛兼滴瀝 胃閉難開飲食乖

此是毒脾先一候 要須 知藥與詳裁

赤白痢

小兒下痢細尋推 不獨 成於積所為 冷熱數般雖各異

實陽調胃在醫師

白痢青冷熱赤紅

夾食滯積也

有風

初患瀉身壯熱

不思飲食亦爲終

且須開胃調

胸膈

腹痛急與用神功

重重熱治一兩日

爲他脉候不浮洪

風痢

風要乘脾黃褐色

看來其利

驚同

但聞不臭斯爲好

獨瀉脾經自有功

五色痢

痢成五色豈堪聞

日久傳成神氣昏

乾痛煩嘔爲惡候

更防見小命難存

五色痢疾無定止

已下方必有五般

青色只因驚積聚

黃多熱毒在脾間 胸高唇細齒還露 臉赤青筋出額姪  
三七已前無變色 其令氣細喘相連 先安五臟不為露溫  
氣次取積後止痢 醫者若心仔細看

下痢足冷

不食痢多頻 熱痛渴焦辰 手足時時冷 血黯命途巡

痢腫腸疼

下痢時多必損脾 令兒肌體腫如吹 雙睛赤脉生雲翳

渴喘腸疼病已危

痢遍身腫

此是氣沉乃積腫才消氣過飽即止

冷刺日久失醫持 遍身寸腫恰如吹 脉洪是氣化為腫

沉實多因有積之 順氣出腫依元治 冷氣兩目便如尿

更有一般不可療食飽而通其大便

瀉痢脫形

秋深瀉痢脫形神嘔逆或沉渴燥煩血氣兩亡肢體冷

涎潮腹痛死之因

瀉痢舌黑

瀉痢舌黑經時五臟傷黃因脾氣敗手足冷須亡

痢噎不食

痢多胸膈滿噎氣食難通臟腑魚腸色虛煩必變風

脾毒積痢

脾間有病本因傷或被醫士熱藥發致使大腸成結澁

加添滯血入於腸眼先因如風候項熱頭溫脚又涼



舌出胸山為外候 多嗜鹽更耐量 先須解毒溫胃口  
此是醫家用藥良

赤痢下血

鼻根白色唇如土 此患原來化穢毒 只緣臟腑冷熱  
致使脾虛不消穀 臉白眼胞山緣青 其作尋常觀不足  
但請看也手足心 點點深紅血沃

疳痢雜色

大便膿血黑青黃 久患成疳滑腸 下部脫肛情倦怠  
上焦煩渴意悽惶 痰來冷熱難干作 因為寒溫理失常  
體熱須宜多進食 豈愁憔悴少精光  
諸痢先候

痢頻都不食

腹脹喘逆

下痢全如黑

渾身熱渴俱

穀道陷如筒

痰中乳不通

發瘧下同

渴煩狂燥喘

腎痛命將終

壯自額其仰

唇枯目白紅

痢中若有此

不必問醫功

日陷唇枯縮

睛中散黑筒

痢中還有此

死證命將終

久田疇未產

積瘀臟中寒

頻痢如膏白

大便若水汁

日漸痿黃瘦

心胸痞滿煩

痰中瘰癧塞

不乳命難安

久痢不治

身熱膿青

身熱血黯

潮熱腹痛

增寒汗出

頭熱足冷

形羸顫軟

睛昏赤脈

眼澁白漠

口臭生痰

面腫作喘

舌頭黃黑

口唇焦赤

喉中鳴響

膈滿氣喘

肌不能食

渴欲思酒 痢如血蠶 或如膿穢 神昏項硬

下痢脉微小者生大而浮洪者死 下痢膿血脉懸絕者死得  
者生 下痢白沫脉沉者生浮者死

一切瀉痢變作死候

糞門如竹筒黑色

口舌發瘡如白梅焦乾不通乳哺

肚皮陷落四肢逆冷

面青乾噉呀目無淚

唇青目陷肚熱如湯

面青黑啼叫不已煩燥

睡卧煩燥手足身體翻轉不穩

或瀉下如雞子白腥臭

多渴口黑時伏齧魚口

瀉下如爛魚腸臭及如黑膠色

瀉久不愈則忽痞脹發大熱氣喘促

通神冷如水四肢軟不收

忽吐長氣胸脅如如紙色

瀉後用藥聖過瀉出外腎黑縮

口氣臭唇黑縮鼻目如蘭青

通身忽作大熱汗出如雨目閉不開

頃刻氣喘促口吐白沫青血

口開不收目直視腎大陷煩燥

吐如雷響瀉下如死雞肝黑腥臭

手足甲黑口吐白蟲項強氣喘促

太乙圓 治嬰孩小兒傷乳食肚腹疼痛下痢赤白

乳香

沒藥 各一錢

胡椒 四十九箇

巴豆 十箇 酥油炙去皮心膜

右為極細末煮麵糊圓如黍米大三五七圓紅痢用蜜煎湯  
白痢生薑煎湯赤白痢生薑蜜同煎湯食前服

水沉丹 治嬰孩小兒泄瀉赤白痢

礬

黃丹 各一兩

黃礬 二錢 溶化

巴豆 十四箇 入藥內煎過後去小用巴豆

右用杵搗千餘下入藥一處和為劑旋圓如黍米大七圓用

新水食前服

註車圓 治嬰孩小兒赤白痢不止

百草霜二錢 巴豆煨去殼心鹽油一錢

右為極細末飛羅麵煮糊圓如黍米大赤痢用甘草煎湯白

痢米飲紅白痢生薑煎湯食前服

斷下圓一名掌中一金 治嬰孩小兒肚痛痢疾

檳榔十塊 丁香 杏仁去皮尖

縮砂去殼 棗去皮核 巴豆去心膜油二箇

右為極細末搜和為劑旋圓如黍米大二五七圓赤痢用生

薑煎湯白痢乾薑煎湯赤白痢甘草煎湯食前服

斷下圓 治嬰孩小兒下痢白日久不禁

茯苓 去皮

白朮

甘草 炙

草果連皮

罌粟殼 蜜炙 罌口用醋糊 罌口用醋糊 罌口用醋糊

右為極細末煉白蜜圓如大實大用生薑煮去核同煎湯研

化食前服

香連圓 治嬰孩小兒冷熱不調泄瀉煩渴水熱不化腹煩腸

鳴下痢膿血裏急後重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦漸變成

疳

白石脂

龍骨

乾薑 炮

黃連 炒

礬 煅 各二錢

左為極細末醋煮麵糊圓如黍米大煩渴用人參煎湯或米

飲食前服

豆蔻香連圓

治嬰孩小兒泄瀉寒熱赤痢疾腹痛

木香

肉豆蔻

麝香 薑黃 玄油 各二錢

黃連

炒七錢半

右為極細末 煮粟米飯圓如黍米大用米飲食前服

黃連阿膠圓

治嬰孩小兒腸胃虛冷却下痢赤白壯如

魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

阿膠

茯苓 去皮各一兩

黃連 炒一兩五錢

右為極細末新水圓如黍米大用米飲食前服

阿膠梅連圓

治嬰孩小兒下痢無問新久赤白青黑腹痛

阿膠

烏梅 去核各一兩

黃蘗 炒

黃連

當歸 去蘆炒

乾薑 炒



赤芍藥炒

赤茯苓

去皮各一錢

用真阿膠效

右為極細末新水圓如黍米大田米飲食前服

芍藥藥皮圓 治嬰孩小兒濕熱黃痢頻傷寒痛下血

芍藥炒

黃蘗

各二錢半

黃連炒

當歸

去蘆炒各一錢二分半

右為極細末新水圓如黍米大用米飲食前服

大養脾圓

人參

去蘆

乾薑

炮

桂去皮

山藥

各二錢半

白朮

茯苓

去皮

縮砂

去殼

胡椒

白扁豆

炒去皮

神麴炒

麥蘖

各五錢

右為極細末煉白蜜圓如芡米用滾白湯研化今冬夏服

水菰木香圓 治嬰孩小兒赤白膿血相雜裏急後重

泄日夜無度積寒久冷臍腹疼痛不思飲食

陳皮

甘草

青皮

當歸

芍藥

木香

乾薑

二錢半

罌粟

右為極細末煉白蜜圓如芡米用滾白湯研化煮過食則服

水菰木香圓

罌粟

去蒂蓋蜜炙黃

當歸

青皮

去穢炒

芍藥

炒各四錢

木香

二錢半

陳皮

訶子 煨去核

甘草 炙 各五錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實太水研化煮過食前服

水煮木香膏

治嬰孩小兒脾胃受冷

臟腑滑泄腹中疼痛日

夜無度腸鳴水穀不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤白膿

血

聖藥散

去蒂蓋蘘蜜浸炒

乳香

肉豆蔻

麝香畏油

縮砂

去殼各五錢

乾薑

炮一錢七分

枳實

煨炒六分

當歸

去蘆炒

芍藥

炒

木香

丁香

訶子

煨去核

薤白葉

厚朴

薑汁製

青皮

去穰炒

陳皮 去白

甘草 炙

藜蘆

炒各三錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用水半小鍾煮 箇去核

同煎三五沸食前服

胃風湯 小兒腹小兒腹冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注  
下腹脇虛滿腸鳴痔瘡腸胃濕毒下如豆汁或下餘血日夜無  
度

白朮

川芎

人參 去蘆

芍藥 炒

當歸

去蘆 炒

桂 去皮

茯苓

右咬咀用水八粟米百粒同煎食前稍熱服

純陽真人參臟湯

治嬰孩小兒腸胃虛弱冷熱不調臟腑等

寒下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疼痛日夜無

度胸膈痞悶肺肋脹滿全不思食脫肛墜下酒毒便血

人參 去蘆

當歸 去蘆炒

白朮 各二錢

甘草 炙

桂 去皮各八錢

肉豆蔻 去油 各五錢

芍藥 炒

木香 各一兩

訶子 各二錢

罌粟殼

去蒂蜜炙 各三兩六錢

真人養臟散

右剉散用水煎食前服暴瀉臍腹滑泄世忌酒麵生冷魚腥油膩之物久痢虛寒加附子炮上片大棗三四片同煎服

丁香

木香

當歸 去蘆炒

肉豆蔻

茯苓 去皮

人參 去蘆

甘草 炙

罌粟殼

去蒂蜜炙 各二錢一分

烏梅去核六分

酸石榴皮

陳皮

赤芍藥炒

黃浦炒

白芍藥炒

厚朴薑汁炙炒 乾薑預

同膠蛤粉炒

訶子炮去核

地榆各一錢八分六釐

右劉散用水煎食前服

參香散 治嬰孩小兒臟氣不怯冷熱不調積在臟腑作成痢

疾或下鮮血或如豆汁魚腦瘀血或下紫黑血或赤白相雜或

成五色裏急後重日夜頻促臍腹絞痛甚不可忍及噤口疳

時痛諸痢無問新舊

人參云虛

白扁豆炒去皮 木香各四錢

肉豆蔻新裹煨

茯苓去皮各

陳皮去白

聖藥散 六歲至五歲各二兩四錢

右為極細末用米飲調化食前服

地榆散 治嬰孩小兒冷熱痢腹痛下痢赤白頻併

地榆 一分 甘草 二分 芍藥 一字

當歸 去蘆 一錢

右剉散用水煎食前服

玄黃散 治嬰孩小兒春傷於風因不暖解脫為風冷所傷或  
亡乳因不夏因飲食居處不調又被風冷乘之以入腸胃先後  
重則下痢其冷氣盛則併下

定粉 海飄消

龍骨

黃丹 銀絹子 同定粉 一錢

訶子 炮去核 二錢

右爲極細末用紫蘇米飲調化食前服

金鎖散 治嬰孩小兒又患赤白痢

性去皮薑汁黃連用吳茱萸同炒去吳茱萸

右爲極細末用紫蘇木瓜同煎湯調化食前服

芍藥甘草湯 治嬰孩小兒血痢發熱

芍藥炒 甘草炙 黃芩炒

右咬咀用水煎食前服

導滯散

當歸去蘆頭 大黃紙裹煨

右剉散用水煎食前服下血出不禁止或瘀血在內胸腹脹滿喘急氣短加檀榔去臍



地榆散

治嬰孩小兒赤白痢發過起膿血者

地榆

訶子

槐花

枳殼

去穢麩炒

甘草

炙

滑石

炒

赤芍藥

炒

當歸

酒洗

青皮

去穢炒

鹽石榴皮

右為極細末赤利甘草煎湯白痢乾重煎湯或水瀉五倍子

煎湯赤白相參用米飲調化食即服

疳脾散

治嬰孩小兒羶瀉下白痢如凍面青啼作渴不止

手足冷

木香

錢半

甘草

炙一錢

五倍子

錢半

白朮

錢

沉香

神麩

炒冬一合

熟地

陳皮

各一錢

薑

各半錢

酸石榴皮 一錢

左為極細末用乾薑末飲煎粥飲調化燕白凍如雞卵白色  
用陳艾三葉煎湯食前服

人參養臟湯

治嬰孩小兒驚悸青色

人參 去蘆

當歸 去蘆炒

白石脂 煨

白朮

甘草 炙各一錢

右為極細末用米飲調化食前服

艾葉當歸湯

治嬰孩小兒白痢腹痛

艾葉 炒

當歸 去蘆炒

乾薑 炮

木香

訶子 炮去核各一錢半

右為極細末用粟米煎湯調化或陳米飲食前服

香梅飲子 治嬰孩小兒腸胃受積脾虛下痢赤白腹肚疼痛

裏急後重裏急和五臟順益三焦陰陽既分腸胃自厚益生熟藥

而治冷熱病可謂功要而穩當也

木香 一片生 烏梅 半生半 當歸 去蘆半生半 煨

甘草 半生半炙 陳皮 去白半生半炒各二錢半

木香 一錢 黑豆 半生半炒三十粒

右咬咀用水煎生黑豆不可打破全用食前服

金粟圓 治嬰孩小兒下痢赤白水穀不化

黃連 炒 神曲 炒各一兩 川芎

枳殼 麩炒 穀芽 赤茯苓 去皮

日正

木香 各五錢

右熟極細末神麴煮糊圓如小米大用米飲不拘時候服  
生熟飲子 治嬰孩小兒虛積痢腹肚疳痛下痢裏急後重日  
夜無度病有冷熱藥有生熟病有陰陽藥有造化有虛實有君  
臣按君臣以理虛實分生熟而均冷熱治主本之法

聖藥殼

大者四箇一半炙去  
蒂蓋內穢浮標者佳

陳皮 二片半炙

甘草

二寸半炙

烏梅

二箇半  
煨去核

棗

二箇半煨去核

生薑

二塊指  
大半煨

木香

一錢作兩  
片半煨

訶子

二箇半煨去核

黑豆

六十粒  
半炒

黃耆

二寸半炙

白朮

二塊半煨

當歸

去蘆二十半煨

右各半生半熟又咀用水煎任意服有生黑皂不要打破要

圓全同煎服

神仙救生散 治嬰孩小兒痢疾亦白晝夜百十行不止

鎮神

去腐切片

罌粟殼 去蒂蓋鹽炒黃焦色各五錢另搗為細末用銅鍋炒

右二味藥各自收用和勻紅痢蜜湯白痢沙糖湯亦白痢沙糖茶同煎湯食前調化服忌食腥醃鹹生冷之物

疳

夫初生嬰兒者托質胞胎成形氣血誕生之後骨肉輕軟腸胃微細乳哺須要合宜臟腑自然調適若乳母寒溫失理動止乖違飲食無節甘肥過度喜怒氣亂醉飲傷勞即令兒成疳也百日已後五臟已前乳食漸多不擇冷熱好食肥膩恣食甘酸臟腑不調並生也

楊氏曰兒童二十歲以下其病爲疳二十歲以上其病爲勞疳  
與勞皆氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也疳者由小兒  
臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣疳皆  
乳食不調甘肥無節而得也或因嬰孩關乳食肉太早耗傷形  
氣則疳自虛生或三兩晷後乳食稍多過飽無度則疳以傷得  
或恣食甘肥粘膩生冷鹹酸停滯中脘則疳因積成或乳母寒  
溫失調飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入  
此皆病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病因無津液而得也  
有因吐瀉之後妄施吐下津液虛渴得之者有因潮熱大下利  
無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏熱冷飲太過渴飲水漿  
變而生熱熱氣未散復干外邪得之又有積癰寒熱膈下硬痛

或者不能漸與消磨遽以硃巴峻取津液暴傷得之者此乃醫誤藥壞病之過也

疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之必積者虛中之積治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補治積不可用藥峻取

錢氏曰小兒初病爲肥熱疳熱則涼之久病爲冷瘦疳冷則溫之小兒易虛易實腹寒則生冷服溫則生熱峻取則再傷脾胃反所益疾上醫處此消積和胃滋血和氣隨順藥餌以扶持之病家調節乳食以脾養之使榮衛調和臟腑充實若或過焉若子未保其往積者疳之母由積而虛謂之疳極凡有積者無不壯熱脚冷若積而虛甚則先扶胃使胃氣充實乃微利急以

和胃之藥扶虛救裏如白豆蔻蘆薈子縮砂蓬莖我本消積等藥  
劑疎利也脇間癖痛亦虛中之積先寒後熱飲水不食或飲水  
而致喘嗽

錢氏有癖為潮熱之說法當解散寒熱即與下癖治療不一宜  
權度於此哉

湯氏曰小兒疳病乃庸醫之壞病也或因吐瀉之後再施吐下  
致脾胃虛弱津液耗亡如日中潮熱乃心虛也肝為心母宜先  
補肝肝實而後瀉心必得母氣而內平潮熱自退庸醫每見潮  
熱妄謂其實妄以大黃芒硝冷藥宣利既多津液內亡而成疳  
頭皮光急 毛髮焦稀 顯縮鼻乾 口乾唇白 兩眼昏爛  
揉鼻擗眉 脊脊軀黃 闔牙咬甲 焦渴自汗 尿白瀉酸



肚脹腸鳴

癖結潮熱

醋嗜瓜菜

鹹酸炭米

泥土而飲

水占飯者

皆其候也

疳曰五疳

病關五臟

以臟別之

自然生疳

久吐

久瀉

久痢

久渴

久污

久熱

久瘡

久嗽

久血

久淋

五疳在臟

目不轉睛乾啼少淚其病在肝

瘦粹少血舌乾多啼其病在心

搭口癡睡胸脘乾渴其病在脾

殷焦皮燥大便乾結其病在肺

身熱尿乾手足清冷其病在腎

菓實甘甜和乳食

交他臟腑有多般

因此腹中皮子

肚上青筋作一團

朝夜渴瀉身壯熱

口瘡眼腫面如蠟

取轉虛中疳積病

補利調脾治得安

頻頻飲水心臌疳

目青脇硬定連肝

肚尚展白睛中起

喘甚鳴籠肺裏藏

好喫土泥愛餌酸

腎疳之候細審看

專心若會通神訣

死後分明有數般

惡哭疳痾痛咬心

吐涎積冷痛難任

每食甜物并桃李

致死蟲生病轉深

喫泥愛土面青黃

本是脾家每被傷

腹痛氣攻蟲上嘔

發熱虛汗不曾涼

小兒喫土面痿黃

髮立毛焦手腦瘡

蓋為臟中積積熱

難消乳食胃曾傷

搖頭揉目熱攻肝

愛暗增明不欲觀

雀目母因風熱盛

斑瘡肺腑翳睛漫

渾身熱似火

手足冷如冰

腹大時加渴

皮膚盜汗蒸

疳眼最羞明

才開泪又傾

肝心俱積熱

生膜翳遮睛

氣血未堅全

因傷積不痊

朝昏寒熱作

頭額汗相連

日夜頻啼叫

蟲生作毒涎

面青多口水

錫菓不宜餐

溫壯痿黃色

多端不阻食

肚高青脉見

瘡癰滿身斑

糞白蟲頻出

眉疎手足乾

尿時如米汁

此證是諸疳

虛黃如熟李

疳水定無疑

氣聚膀胱內

陰囊腫似吹

小兒無辜疾

皆因母所爲

若能精慎護

何得漸疳羸

驚撲成風急 寒暄即氣痿 那得塗兩乳 何間著衣衣

哭物無今早 學言一作行不怕遲 論中人不許

方內一作難醫 腮腫肝還盛 脊高力已衰 頭皮光曜曜

首髮白稀稀 肝壅侵雙目 皮黃入四肢 肚大非爲飽

口讒不是飢 胸中常痞悶 喘息轉殷恹 晝鼓何曾打

綉衣無意持 既此須速理 硬氣致身危 油沫汗不理

糞黑不須醫 不專求藥餌 有意叩神祇 父母情懷測

仙方還自施 神功廣集藥 得效用烏犀 堪施調理者

方知有妙奇 雖然黃瘦子 變作化生兒

瘡癤患瘦

寒熱作連綿 成疔久不痊 髓中蒸瘴作 骨血漸羸乾

四躰如枯竹 毛焦皮魚斑 舌瘡無齒露 難保此生痊

驚疳相傳

驚病無疳病 相傳心與脾 噬煎多愛哭 憔悴漸疳羸  
驚熱便黃沫 疳寒尿白脂 睡中眠不穩 遍躰有瘡痍

疳證

小兒五疳 因過多食 或因甘甜 驚氣入腹 或緣患後  
不長肌肉 致成疳疾 不思乳食 朝好暮惡 或發潮熱  
四肢羸瘦 腹急三熱端 頭髮稀疎 喜食泥土 變成疳勞

肝疳白瘕

肝疳白瘕眼中瞤 怕日羞明淚不乾 交甲挫頭肌躰瘦

肝疳堅癖塊多涎

清血

心時熱不引精光

壯熱唇紅面色黃

才卧皮膚流盜汗

睡中驚大驚悸

脾疳腹脹

脾疳腹脹肚赤黃

食物難消又滑腸

揉鼻揉目多愛吐

蛔蟲和糞瀉非常

肺疳咳嗽

肺疳咳嗽肺旺羸

喘急痰涎氣力多

疥癩皮膚生瘡痒

頻頻喫食口多飢

腎疳骨熱

腎疳骨熱上偏墜

齒黑唇焦瘡匿鼻

增寒壯熱手如冰

每夜嚔前不穩睡

肝風疳

搖頭揉口鼻 白膜眼中縵 楷磨常淚出 兩目不曾乾  
顏容面青色 渾身瘡癬斑 毛焦并髮緊 此病本從肝

心驚疳

渾身壯熱甚 四肢全不任 面黃并臉赤 怕冷愛重衾  
口鼻常乾燥 根源即漸深 只因驚撲着 此病本從心

脾瀆疳

食物難消化 情中愛喫泥 腹高青脉起 頭髮薄稀疏  
喘息饒呵欠 無歡只欲啼 痢多酸餽臭 此病本從脾

肺氣疳

喘多并嗽逆 口鼻脛生瘡 昏昏饒愛睡 脉瘦又滑快

四肢無氣力 容兒不同常 瀉膿并吐血 此病肺家傷

腎急辨

瀉痢時頻并 吐逆轉加深 大腸紅頭脫 壯熱無腹驚

乳食全不進 手足冷如冰 急并難治療 此病腎家因

小兒五臟發疳歌

肝

肝臟目頻痛 雙眸又不開 吐利頻頻盛 疳蟲瀉出來

眼溢尊思睡 唇青淚滿腮 必竟蒸熱發 此病是肝來

心

心臟渾身熱 四肢力不禁 面黃兼頰赤 怯冷愛食衾



口鼻常乾燥 根源積漸深 舌上瘡斑點 此病本從心

脾

脾臟精神好 早晚辯疳類 吐出還飮飯 見泥便欲食  
莫教傳臟腑 他時即便難 醫士多不識 此病在脾間

肺

肺臟連時發 咽痰不出聲 口唇齒根皴爛 腹脹幾時輕  
肚鳴下部痛 脫肛腎未徵 肺後轉加甚 此病致之形

腎

腎臟腰間氣 尋常祇受驚 寒中米不化 皮膚瘡疥鱗  
疝氣陰沉久 手足冷如冰 口內瘡膿血 此病腎中生  
五臟五疳五般看 治法詳推重 未難 若見面黃肌肉瘦

齒搖髮落即爲疳

身軀如柴 頭皮紫黑 目黃睛散 喘促心陷 兩脇湊癰

刺痛氣短 皮生紫瘡 牙齦黑爛 舌如白梅 乾噦塞噎

乳食直瀉 唇臉如稿 皆不可治

喘促目睛黃 頭皮紫黑光 龜胸心下陷 鋸脊舌喉瘡

手足如乾竹 枯蠹氣血傷 諸疳若有此 死證不相當

諸疳惡證

肝疳左脇結硬頻數吐涎目睛青筋眼角黑氣不治

心疳飲水不已食則驚啼耳邊紋多舌上黯黑不治

脾疳喫泥泄痢水穀不消唇白腹高人中平滿不治

肺疳咳逆氣促頻瀉白沫身上粟生其色斑黑不治

腎虧飲水好鹹小便如乳耳焦眉落牙黑骨枯不治

### 五絕不治

其或清泄不休脫肛掣逆抱起昏沉手足垂軟觀及脚心全不知覺項筋舒展身軀變冷是則爲五絕證候甚者胸陷喘噓乳食直瀉腫滿下痢腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉先紫與夫疳勞瀉渴面槁色夭骨露齒張肚硬不食者皆危篤矣抑有聞焉石韞玉而山輝水懷珠而川媚人受父母之氣以生精血不榮胞胎有損如草木萌芽之受傷望其華實之不猥褻者難矣丁奚哺露腦疳瘡非胎中已受之病乎不持此爾兒方周晬母復有孕乳汁成毒飲鬱小兒神氣亦致昏三疳羸是謂之戕病凡此等類盧扁復生難施其功余以終篇所以爲之抽關啓鑰云

一切疴後變作死候

手足如竹筒口舌上黑白瘡發喘渴熱

身軀如柴無肉色青黑耳鼻生瘡

目如碧色身軀乾枯吐出不沫瀉下白蟲

龜胸鋸脊氣喘口舌生瘡喉中涎噎

解頤鶴膝下瀉如米泔外腎黑糞門如竹筒

肚大青筋乳食即吐塞噎手足細軟不能行

忽吐下黑血連蛔并小白蟲出無數

手足鼻耳口舌後胎生黑大腫毒瘡不乳

腹中刺痛面青黑吐瀉下黑血并蛔等蟲

手足四肢如冰頭項拘軟不收口伴痰流

五疳保童圖

治嬰孩小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若

乳哺有節則臟腑相調乳母寒溫失理飲食無常醉飽喜怒及  
百醉以後五歲已前乳食漸多不擇生冷好餐肥膩甘酸之物  
即成五疳

一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛流汗遍身合面而臥目中  
淫痒肉色青黃髮立頭佳筋青腦熱腹中積聚下痢頻多久而  
不痊轉甚羸瘦

二曰心疳其候渾身壯熱吐痢無常頰赤面黃胸膈煩滿鼻乾  
心燥口舌生瘡利久不痊多下膿膿血有時盜汗或乃虛驚

三曰脾疳其候腹多筋脉喘促氣麤乳食不多心腹脹滿多嗜

食逆面色黃骨立毛焦形枯力劣胸膈壅滯水穀不消口鼻

常乾好喫泥土情意不悅愛憎不明腸胃不和痢多酸臭

四曰肺疳其候咳嗽氣逆皮焦乾焦饒涕多啼咽候不利揉鼻  
咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤痒腹內氣脹乳食漸稀大腸  
不調頻頻洩痢糞中米出皮上粟生

五曰腎疳其候肌肉消瘦齒齦生瘡寒熱作時口鼻乾燥壯熱  
如火脚冷如冰吐逆既增乳食減少瀉利頻併下部開張肛門  
不收疳瘡痒痛是走馬疳已下疳疳疳皆治療

蟾頭一錢  
黃連一錢  
熊膽一錢

麝香一錢  
胡黃連  
黃連炒

白鮮頭  
白鮮頭炙黃無炒白鮮葉充代  
草龍膽去蘆

雄黃水飛  
青皮去穢炒  
五倍子

夜明砂微炒

苦棟根

天漿子炒

青黛各二錢半

右為極細末糯米飯圓如黍米大一歲二圓用米飲不拘時

候日進三服

消疳肥兒圓 治諸疳積

蘆薈一錢

胡黃連

史君子去殼

青艾去穢炒

黃連炒

陳皮去白

半乾桑葉去塵

三棱炭

蓬莪木煨

鱉砂去殼

磁石去灰

白木

雲母去土

木香

香附炒

秦木去穢

夜明砂炒

檳榔去穢各二錢半

阿皮炒二錢

人參

去蘆二錢半

無英

枳實炒二錢

羅子

炒各三錢一兩

神麴炒

麥蘖

炒各五錢

柴胡去蘆三錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用米飲食遠服

蘆薈圓

治嬰孩小兒食肉太早生蟲積發熱脾泄

蘆薈一錢

無英

檳榔去臍

青黛

黃連

炒各二錢半

胡黃連五錢

蟬蛻去足二錢

麝香

一兩

右為極細末猪膽汁圓如黍米大用米飲食後服

香積散

治嬰孩小兒百日內下痢有蟲如頭髮

木香

甘草

炙各一錢

檳榔去臍二錢



史君子

去殼  
七箇

爵香

一字

右為極細末用茶飲調化食前服

消疳圓

治嬰孩小兒諸疳面合地黃多睡如醉腹脹面黃

聲啼叫心痛口乾糞下有蟲蓋由曾喫不熟肉食

檳榔

去脂三箇

蕪荑

去皮二錢

蘆薈

一錢

夜明砂

二錢

史君子

去殼二  
十箇

黃連

炒三錢

苦練根

地內者去皮五錢

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食遠服

肝疳即風疳

出乳母不調肝臟受熱所致也若乳母寒喧不調滋味不節

外感風寒內傷喜怒邪氣未撤遽爾乳兒多成風疳疳者腹之

候上隔伏熱痰涎雍滯以致肝風入眼赤腫翳生眵淚爛膜

癢按睛暗翳甚至經月眼合亦名暗翳外障

揉頭揉目 白膜遍睛 眼青淚多 翳根髮立 筋青翳

甲癢筋攣 燥多汗多 下迎搶睛 謂之肝疳

天麻圓 治嬰孩小兒肝疳風疳疳眼

青黛 黃連炒 天麻

夜明砂炒 川芎 煨

五靈脂 水飛各半錢 防風 去蘆又

蟬之去足七分 金蟬 去毒炒 煨

燈頭 煨 二錢半

右為極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用薄荷煎湯食遠

服

銀圓子

治嬰孩小兒肝疳服青白銀錢并赤白銀圓合地

而卧

龍齒

煅二錢

茯苓

去皮

羌活

去風

黃芩

炒

茯神

去皮木

細藤

久二錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大銀錢並兩分用米飲食遠服

雞心圓

治嬰孩小兒肝疳面黃黃瘦服此藥水

檳榔

去脂三箇

赤芍藥

龍膽草

去土

羌活

去風

獨活

川芎

各二錢

皂莢

燒存性三錢

右為極細末蒸餅圓如黍米大用熱水不拘時候服

生熟地黃湯 治嬰孩小兒肝眼閉合不開內有膜

生地黃

熟地黃

各五錢

川芎

赤茯苓

去皮

枳殼

去穢麩炒

杏仁

去皮尖炒

黃連

炒

半夏

反麩

大麻

煨

地骨皮

甘草炙各二錢半

右咬咀用生薑三片黑豆十五粒同前臨睡服

心疳即驚疳

由乳母不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生  
難滯內有滯熱未得疏通故心驚鬱而作驚疳外證

身壯熱

臉赤唇紅

口舌生瘡

胸膈煩悶

小便赤澀

五心皆熱

大出汗發渴

齒齙虛驚

謂之心疳

茯神圓 治嬰孩小兒心疳驚疳

茯神 去皮木

琥珀

黃連 炒

赤茯苓

去皮各三錢

釣藤皮

遠志

去心生薑製

蝦蟇

去頭煨灰各二錢

葛蒲

細節一錢

麝香

一字

薤薈

半錢

右為極細末粟米煮糊圓如黍米大用薄布煎湯食遠服

龍膽圓 治嬰孩小兒心疳頰赤面黃鼻乾心燥口内生瘡驚

悸煩渴頭髮作穗

龍膽草 十斤蘆

赤茯苓

去皮各四錢

黃連 炒

胡黃連 各二錢

朱砂

水飛半

麝香

一字

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用熟水食遠服

脾疳即食疳

由乳母不節脾胃受傷所致也或乳母恣食生冷致傷脾胃乳兒過傷或飯後與乳致使吐乳多眠久則變為乳癖腹脹結塊亦名姦疳外證

面黃身黃 肚大脚細 吐逆中滿 乏力酷啼 水穀不消 泄下酸臭 合面困睡 減食與泥 謂之脾疳 靈脂圓 治嬰孩小兒脾疳食疳

五靈脂 水飛 縮砂 去殼 白豆蔻 去殼

麥蘖 炒 蓬莪朮 煨 青皮 去穢炒

炙甘草 去殼 蝦蟇 炙焦 橘紅 去白各一錢

右為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

雞肉前圓 治嬰孩小兒脾疳面足痿黃心腹膨脹滿身瘦瘠  
乳食不進好喫泥土潮熱往來焦喘出汗

蘆薈

人參去蘆

北柴胡去蘆

史君子去殼

胡黃連

黃連炒

蕪荑

去殼炒各三錢

右爲極細末拌和用黃雌雞一隻重斤籠者專麻子飼之  
至三日依事治法去毛令淨放於臀後開孔去腸肚淨拭乾  
入前藥在雞腹內以線縫取小甌先以黑豆鋪甌底厚三寸  
安雞於甌中四傍亦以黑豆圍裹上亦以黑豆厚三寸蓋之  
自日出時蒸至晚候放冷取出雞骨淨將肉研細酒煮麪糊圓  
如黍米大用水飲食遠服

捉疳圓 治嬰孩小兒脾胃受疳面黃腹脹多睡如醉愛喫生

米紙炭礱丸上泥十

丁香

木香

各一半

黃連

炒

蕪荑

去皮炒

蚌粉

神麴

炒

三稜

煨

青皮

去穰炒各一錢

右爲極細末猪膽汁煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

肺疳即氣疳

由乳食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺氣所通其

不和則風濕乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤癢瘡

是爲鼻疳其瘡不痛汁所流處隨即成瘡亦名瘡蠶外證

咳嗽喘逆

壯熱惡寒

皮膚粟生

鼻癢流涕

咽喉不利



顧爛唾吐

氣脹毛焦

泄痢頻併

謂之肺疳

清肺飲

治嬰孩小兒肺熱疳積乳汁臭或生息肉

桑椹白皮

紫蘇葉

前胡

去蘆

黃芩炒

當歸

去蘆炒

天門冬

去心

赤茯苓

去皮

桔梗

去蘆炒

連翹

防風

去蘆義

生地黃

甘草

炙各一錢

右咬咀用水煎食後服

化屋圓

蕪荑

去皮

蘆薈

青黛

川芎

白芷稍

胡黃連

黃連炒

蝦蟇

煨各一錢

石為極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用杏仁去皮尖煎湯臨睡服

龍腦膏 治嬰孩小兒肺疳鼻下赤爛頭髮焦乾揉鼻指眼旁

下血痢

龍腦一字

朱砂一錢

釣藤

赤茯苓 去皮

人參 去蘆

甘草炙

夜明砂 各一錢半

石為極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食後服

最常用熊膽泡湯小筆蘸洗候服化蜜圓進數服後用

青黛

當歸 去蘆

赤小豆

瓜蒂

地榆

黃連 炒

陰陽入經卷  
齒齕

雄黃少

右為極細末入量欬瘡

腎甘即急瘡

田乳食不調臟腑伏熱遂使孩提心下擾悶若上蝕齒斷則口  
瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛爛濕癢生瘡療治不痊  
精髓消耗難以有膠蟲者慙也曰為濕隱多因疳傷久痢腸胃  
受濕得之壯如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒屬腎  
腎王虛纔受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名  
曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱血逆出名  
曰宣露甚者牙皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不援  
生矣外證

腦熱肌削 手足如冰 寒熱時來 滑泄肚痛 口臭乾渴

齒斷生瘡 瓜黑面鰐 身多瘡疥 謂之腎疳

連黃圓 治嬰孩小兒腎疳

熟地黃 四錢半 赤茯苓 去皮 山茱萸 去核

當歸 去蘆 川芎 川棟子 去皮核

牡丹皮 山藥 吳茱萸 去核各二錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用滾白湯研化食前服

殺疳圓 治嬰孩小兒腎疳面無顏色黃瘦多有齒齦臭爛出血

不思飲食

木香 肉豆蔻 麩炒去油 胡黃連

夜明砂 茯苓 去皮各五錢 麝香 一字

右為極細末糕圓如赤米大用米飲食遠服

雄黃散 治嬰孩小兒賢疳又名急疳又名走馬疳齒齦宣露

臭爛出血

雄黃如黑豆大七粒 雄棗去核七箇

右將一粒雄黃入一箇雄棗內却將小鐵線纏定留三四寸長用油燈上燒以棗外黑內乾為度將碗令定再燒第二箇如前法候燒得一二箇棗停少時為極細末少許乾擦牙齦臭爛出血處停少時嚙去涎再擦以血止為度

疳蟲

近疳出蟲者疳傷之源雖起於乳哺不調然臟腑停積已久其不化而為蟲其蟲如絲髮或如馬尾多出於頭項臉背之間裏

治青黑者用藥條也

人參

無英

鯉魚

鱖魚

蝦蟇炙焦各

蘆薈半錢

右為極細末雄猪膽汁圓如赤米大用陳米飲或史君子去  
熱煎湯凡蟲月首則頭向上凌早服

蛔疳

蛔疳者夫乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蟲計證

皺眉多啼 嘔吐清沫 腹中乍痛 肚腹青筋 唇口紫黑

腸頭濕瘡 謂之蛔疳

脊疳

脊痛者蟲鍾脊骨身熱羸黃積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴  
脊骨如錐齒或一指生瘡頻啣瓜甲是也

下蟲圖

新苦棟根皮 貫衆 木香

桃仁 云皮火炒 黃芩 炒 檳榔 土厚各一錢

鶴虱 沙 錢半 輕粉 一魚 蟾頭 一錢

史君子 去殼二十五箇

加當歸 去蘆炒 黃連 炒各一錢

左為極細末蒸餅圓如茶米大用肉汁湯食前服

腦疳

腦疳者腦中素受風熱生下乳餅失常頭以手摩頭者此也

熱如火髮結如穗遍身多汗頭暈頭高是也或臨產多熱亦然  
易損兒眼

龍膽圓 治嬰孩小兒腦疳熱驚瘡

龍膽草去重 川升麻煨 苦練根皮

防風去蘆義 赤茯苓去皮木 油髮燒灰各一錢

青黛 黃連炒各一錢 續斷半錢

右爲極細末猪膽汁浸米糕圓如赤米大用薄荷煎茶蘇泡  
湯食後服仍以蘆葦研細末吹鼻中

疳渴

疳渴者臟腑以有疳氣加之乳母恣食甘肥酒麵炙煨法以邪入  
心肺壅熱日則煩渴飲水飲食不進夜則渴止是也服



參夏白朮散

黃連圓

治嬰孩小兒疳渴

黃連

雄猪膽汁浸一夜

瓜蒌根

烏梅

去殼

杏仁

去皮尖

蓮肉

去心

茯苓

去皮各二錢

右為極細末牛膽汁浸米糕團如黍米大用烏梅生薑蜜同

煎湯食遠服

全生方曰凡疳病皆因津液亡竭飲食之中入藥食之

王氏曰仍以前藥加黃連入猪肚內縛口煮爛入臼內杵細末

圓用水飲食後服生津清心止渴調脾諸肝常服

疳瀉

疳瀉者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是也勿用熱藥止之

歌曰

小兒疳瀉時連軟腫如雞此瘕名疳注醫士細意看  
香蔻圓治嬰孩小兒疳瀉

黃連炒

肉豆蔻生

木香

訶子煨去核

縮砂去殼

茯苓去皮各一錢

右爲極細末白米飲圓如黍米大用木飲袋煎服

疳痢

疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻下惡物是也

木香圓

治嬰孩小兒疳痢

黃連炒三錢

木香

厚朴薑汁製炒

縮砂去殼

夜明砂綿紙炒各一錢

訶子煨去核一錢

右為極細末飯圓如黍米大用艾生薑同煎湯食前服

香橘圓

史君子去殼

訶子煨去核

神麝炒

麥蘖炒

甘草炙

厚朴薑製炒各一錢

橘紅去白一錢

木香一錢二分

右為極細末凍白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

疳脹滿

湯氏曰此瀉與積瀉相類但臭如抱退雞子瀉又不頻又不如  
水聚作一次口難得止實者宜微取積

人參散

人參 去蘆

白朮

黃芩 蜜炙

茯苓 去皮

甘草 炙各二錢

史君子 去殼五錢

白薑 五錢

胡黃連

丁香 各二錢

木香 一錢

肉豆蔻 麩炒煨去油一錢

右爲極細末用陳米飲調化食前服

六神圓

肉豆蔻 麩炒煨

木香

丁香 各二錢半

訶子 去核一錢

史君子 去殼

廣藿香 半錢

右爲極細末粳米飯圓如黍米大用米飲食遠服

肝腫脹

疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故令腹壯膨脹由是脾胃受濕腎中不能宣導故令頭面脚手浮腫是也

橘圓子 治嬰孩小兒疳腫脹

護國子

炒五錢

陳皮

去白

青皮

上曬炒

檳榔

去臍

一黑牽牛

炒

五靈脂

水煎

赤茯苓

去皮

三蓬莪朮

煨

木香

各二錢半

右爲極細末飛麴煮糊圓如黍米大用紫蘇桑根白皮同煎

湯不拘時候服

異香散

治嬰孩小兒疳積

腫脹調脾胃

三棱炮

蓬莪木炮

青皮去穢炒

陳皮去白

半夏麴

藿香葉

桔梗炒

益智去殼

枳殼去穢麴炒

香附子炒

縮砂去殼各五錢

丁香錢

甘草炙一錢半

右剉散用生薑二片棗一箇去核同煎食遠服

疳勞

疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胸前熱而發瘡盜汗骨蒸嗽喘枯悴是也

渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可治

黃耆湯治嬰孩小兒疳勞

黃耆蜜炙

當歸去蘆炒

川芎

芍藥炒

生地黃

蝦蟇炙去足

鱉甲

醋炙焦各錢半

人參去蘆

茯苓去皮

橘皮

去白

半夏麩

柴胡去蘆

史君子

煨去殼

右咬咀用生薑三片棗一箇去核同煎食前服

養血煎

人參

去蘆五錢

川芎

燕美

柴胡

去蘆各一兩

史君子

去殼

胡黃連

黃連

炒各二兩

石用養血一盞吳茱萸一兩同和一黃連淹一宿次早炒乾

透去惡米黃并血只用二通餘藥杵搗極細煮粟米粉糊  
圓如黍米大用熟水食前服

猪胆圓

木香

黃連炒

生地黄

柴胡

去蘆冬

鱉甲

九筋者童子下便浸炙一兩

方為極細末猪肚一箇入藥在內縛定口入瓦甕煨取出  
杵搗壯藥圓如黍米大用米飲食前服

無辜疔

無辜疔者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲  
如米粉不速破而去之免蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑以致生瘡  
癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭暈骨痛是針刺破膏藥貼



丁癸

其若手足極細項小骨節削軀痿廢大膝突蹠突胸陷或生  
穀微是爲丁癸之證

丁癸者由乳食過度脾胃虛弱不能磨消哺食不化則水穀之  
精耗損無以榮其氣血故肌肉消瘦面黃腹大頸小者是也

哺露

虛熱往來頭骨分開雖食吐蟲煩渴嘔噦此三者皆柴骨枯露

危矣

哺露者因乳食不化積滯於脾胃致脾胃衰弱不能飲食血氣耗  
損不榮肌肉而聚於腹中腹中不通故作潮者是也

丁癸哺露者皆因脾胃虛弱不能消化水穀以致氣血虧損

瘦弱氣不足復為風冷所傷便骨枯露有胎中受毒  
致之此皆無辜積類之疾病而至此不幾殆哉

丁癸噴露證 皮膚蒼黑斑 枯焦肚大作 渴熱項并寒

乳食隨便出 如膿瀉數般 舌喉蒼白滿 父母轉悲酸

久積成疳因失治 肚高頸細變丁癸 更無手足如竹樣

面白血黃汗不時 積得疳後曰丁癸 哺露因而又得之 腹大青筋蟲滿肚

吐頻瀉數急調脾

十全丹 治嬰孩小兒丁癸哺露

青皮 去穢炒

陳皮 去白

二稜 炮

蓬莪木 炮

川芎

白豆蔻 去殼

檳榔去穢

縮砂去殼

史君子去殼

木香各五錢

蘆薈一錢

丁香二錢

蝦蟆煨

香附炒各三錢

右為極細末猪膽汁浸米糕圓如黍米大用米飲食遠服

醍醐散

治嬰孩小兒吐瀉後調和脾胃進乳食及丁奚疳露

虛熱煩渴

陳皮去白

縮砂去殼

厚朴薑製炒

麥蘖炒

烏梅各五錢

良薑用東壁土炒

葛根

烏藥各二錢半 草菓炮二錢

甘草炙三錢

右以咀用生薑三片棗二箇去核同煎食前服

冷熱疳

瀉多膿血口加瘦弱

通神固 治嬰孩小兒冷熱疳

胡黃連

黃連炒各二錢 木香

蘇莢各二錢

丁香

肉豆蔻生

史君子

去殼各一錢 煨麻黃去骨一錢半

右為極細末蝦蟇肉圓如黍米大用米飲食前服

冷疳

湯氏曰小兒冷疳多渴好卧冷地乳食不進漸成羸瘦其證難明有甚無大便滑泄此證錢氏木香圓服病愈可服有效驗其病在內痢色無常其末青白肢軀軟弱目腫面黃遂致遍身熱

瘡煩渴不已

木香圓 在瀉門

猪肚黃連圓

雄猪肚一具 黃連七兩

右剉水浸濕納猪肚內縛定口入粳米飯上蒸爛安石臼內入步飯杵括圓如黍米大用米飲食遠服後用

川芎 生地黃 茯苓 去皮

茯苓 去皮 甘草

右咬咀用水煎食遠服調血清心用薑蔥圓肥地圓合服佐之可也

方 大腹皮 苦參 白芷 去蘖煎湯洗

肥熱疳

小兒初病謂之肥熱疳其候

病多在外 鼻下赤爛 頭瘡濕瘡 五心煩熱 欲食不食

渴飲冷水 煩燥臥地 肚熱足冷 潮熱往來 乃欲傳疳

補脾進食 磨積消疳

肥兒圓

巴豆

去油心皮膜石剉將巴豆炒少時傾出留藥去巴豆不用

青皮

去穢

陳皮

去白各五錢

三稜炮

蓬莪朮炮

神麴炒

麥蘖炒

川棟子

去殼揀

黃連炒

史君子

去殼五錢

蕪荑

蘆薈

各一錢

胡黃連

二錢半

青黛

殺蟲去足散一錢半

右剉一處入銚內用煎巴豆微炒去巴豆和前藥為極細末  
煮麵糊圓如黍米大用米飲食遠服

凡久積欲傳疳候宜作虛中積治之虛則補而後取實則取而  
後補切不可使用胡黃連蘆薈治補服胃脾散磨積消積藥之  
五疳潮熱

小兒肚腹髮焦切不可用大黃黃芩損傷胃氣恐生別證難治

胡黃連

五錢

五靈脂

水飛一兩

右為極細末雄猪膽汁圓如黍米大用米飲食遠服

取胎毒者取而後補虛者補而後取當以補脾胃

淡豆豉

上粒

巴豆

去油膜心三箇

右并如泥團如黍米大用生薑煎湯食前服取下車

除痰

取交蛇一切瘡毒

夜胡砂五錢

右入瓦甌內取精猪肉三兩薄切入甌內水煮取肉干前與兒食澄猪肉汁令兒飲汁食肉因取干腹中胎毒次用生薑四兩和皮切炒黃已拌用黃連一二兩一味煮細末煮麵糊圓如黍米大用米飲食前服

疳疔不消

肥兒同用蘇合香入朱砂五靈脂細末煉白蜜圓如黍米

大用石菖蒲煎湯不拘時候服

李時珍集方

藥



魛病音奇

小兒所以有魛病者是婦人懷娠有惡神在其腹中胎妬嫉他  
小兒今病也魛者小鬼也妊婦人下地招魛魅人時有此爾  
魛一爲疾喜微微下痢其熱或有土氣毫毛皆長身軀不悅是  
其證也

婦人先有小兒未能行而地更有娠使元飲此乳亦作魛也令  
兒黃瘦骨立髮落壯熱是也

阮氏曰小兒一二歲而色痿黃乳食不化腹脹如紋或生青筋  
口斬羸瘦此由乳母乳未斷乳而又育乳名曰愛妳小兒  
急之致有此疾

孫思邈論小兒魛病者婦人懷娠惡神導胎中穢穢妬小兒

致令此病其壯微微下而寒熱來去毛髮鬚髮神色不悅腎鑑  
云眩病是小兒鬼也蓋凡有病則腹中子之魂識疾逆也非母  
之眩子緣不靈孕婦身小嬰兒眼淨畏而致患以愚觀之既言  
嬰兒眼淨畏而得之其語嬰兒未能言安能有是語也又所言惡  
神導胎鬼神之事吾亦難明一說俱未之信也要之養神成胎  
其子必靈孩鬼成胎其子必怪靈子者如后稷端木異是也怪  
子者如漢末之時三頭二首是也今之小兒形像於形既非其  
靈又非其怪一旦受病證可謂惡神導胎者乎蓋婦人妊娠之  
時氣血不榮或頭疼嘔吐或胎動不安或氣滯不注經絡澀滯  
乳脉不調將乳飲之令兒面黃腹脹臟腑不調寒熱來去毛髮  
鬚髮精神不悅日漸黃瘦者乃是飲母眩乳故也皆非惡神鬼

乳為之其間有兒飲喜乳怒乳熱乳寒乳氣乳病乳壅乳醉乳  
淫乳亦令兒病斷乳小兒必無魃病如母有病孕小兒飲別乳  
亦無此患證類本草云小兒繼病因母有娠乳兒兒有病如瘡  
刺他日亦相繼腹大或瘡或發其有受胎或實或虛寒或大飽  
而大飢或大醉而大勞至大雨大雷大寒大暑及陰陽不等犯  
諸禁忌受胎之氣令兒生下故多在懷抱中宜有是病也所謂  
惡神傳繼之說蓋因此證而妄云也若夫靈芝怪者是必有說  
焉

小兒有患魃病者非五臟傳變亦非六腑所主也緣兒生後方  
且周時母復有孕血氣所蔭分之二端是故肝胎漸傷乳汁成  
毒虛邪相攻兒勿致疾歟率其氣鬱傷其神魄令兒疳虛疳

枯痺煩燥朝昏嘔噦日夜不可得寐理但速與斷乳溫平胃氣和順血脉自然而愈其有萎忙致痰乃成無辜證候何足怪訝者耶

龍膽湯

治嬰孩小兒疳病

龍膽草

去蘆

釣藤

去心

柴胡

去蘆

桔梗

去蘆炒

芍藥

炒

川芎

茯苓

去皮

甘草

炙各一錢

人參

去蘆半錢

大黃

濕紙裹煨一錢半

右剉散每服

二錢用井水煎食前服仍以紅紗袋夜明砂與

兒帶

鬼胎

婦人產育有患鬼胎者廣鄙謂婦人納鬼之氣而受之實非也  
鬼胎者乃父精不足母氣衰羸胎首滯派之不及護愛安存之  
失調方及七八箇月以生又有過及十箇月而生者初產氣血  
虛羸降誕艱難所言鬼者即胎氣怯弱榮衛不克致子委前諸  
猶如菓子結實之時有所墜藉不到灌漑爲物偏小其形猥褻  
無有可愛如此之謂胎氣陰萎常與圓散扶挾乳哺自調氣血  
克蔭腸胃固壯即保其靜善蓋由受氣不足稟賦不全忽爾橫  
傷非可惜耶

陰囊痛

人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中  
節可也夫苟賢經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經久風

邪滯氣傷之不為陰腫者希矣間有嘔吐怒氣閉繫於下結聚不散以水灌之不行亦能發為此疾

楊氏曰腎主納氣乃人之氣海焉腎氣為風寒所乘為暑濕所鬱為驚怒驚恐所傷而水結又散又為氣搏邪聚於中為疝為奔豚為小腸氣為膀胱等證不特外腎小腹作痛或攻刺腰脇或遊走背脊或邪氣搶心心下痛滿或痛流臍傍或脇之左右如豆或臍之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘腹大如盤或壯熱惡寒或洒淅寒熱有大小便秘者有裏急而下泄者其於陰間則卵有大小申縮上下不常囊有腫脹急痛而發欲無定夾冷驚怒則塊物上逼囊根或攻腹脇皆謂腎氣

治法大綱風則散之寒則溫之暑則解其熱濕則滲其水驚怒

則謂其心氣水與氣搏則行其小便其間又以治腎氣逆療之  
大要通利竅利為先毋曰腎虛不敢踈泄蓋腎病邪氣所干若  
病何由愈倘或姑息畏虛妄投剛補之劑大小踈秘而  
不通邪氣入腹冲心危殆心矣然腎氣雖虛得之當明冷熱及  
冷熱不調之證冷者脇邊及外腎清冷小便清而多過寒則發  
熱者內夾暑氣或積酒毒熱熱則外腎與小腹俱熱小便數而  
泄遇熱則甚冷熱不調者小便外腎下冷乍熱大小便或泄或  
利用藥溫涼流行踈導於其下矣若逆氣長吁中脘停酸燥悶  
嘔吐最惡候乃天一生水腎虛皇主三焦筋聚於陰器必藉陽明胃  
土以養今脾土未強腎水既隔脾土又二焦陰陽不升降榮衛  
不流行大小便秘澀腎汁胃汁必為酸汁而暴吐者大抵難治

巢元方論曰諸筋會於陰器邪客於厥陰少陰之經與冷氣相搏則陰囊腫痛而引縮經中雖分四證曰腸癰氣癰水癰和癰然小兒患此若治之不早則成癰疾如腹中腹痛冷汗目出而陰囊二子縮縮入腹痛止方出名帶內麝有陰莖全縮不見有陰囊足腫不見此因肝腎氣且以橘子仁煎湯服又曰由腎虛或坐地爲風冷浸氣侵襲或爲地龍所吹或啼叫怒氣結聚或水道受熱澁滯而成

經曰癰癢和膚脹者陰亦盛而股脹不通故曰癰癢和由是觀之乃陰氣盛而致有此麝縮者筋急也筋遇寒則汗縮遇熱則弛張故三因所用方法以寬小腸氣疎風爲治然小兒此證多因坐陰潤之地感風濕而得有外腎無故而膚囊腫大不燥不



痛光亮如吹此名氣虛外腎腐壞亦腫通明及女兒陰戶腫脹乃心熱之所得也

陰囊腫痛

厥陰少陰寒激搏致令腫縮且溫藥光浮不痛作虛治亦腫須憑涼劑却

浮囊腫痛

浮轉尿時痛尿時恰似常非干淋瀝病一氣壅結膀胱香木香湯治嬰孩小兒陰囊無故而腫或痛縮初因陽明有風熱濕氣相傳所以如是法當寬此一經其證自愈蓋陽明受病不能養其宗筋故也

青木香

去蘆

枳殼

去蘆炒

甘草

天一錢半

右吹咀用水煎食前服

五消散 治嬰孩小兒膀胱久受熱毒致陰器腐爛亦腫脹痛

赤小豆 赤芍藥炒 枳殼去穢生

朴硝 商陸一

右爲極細末用栢樹枝煎湯候冷調金惠處照五苓散加車

前子薏苡仁用水煎食前服

天花散 治嬰孩小兒外腎腐爛

天花粉一兩 甘草炙一錢半

右吹咀用水煎入酒食前服

桃仁圓

桃仁去皮尖麤桂去皮

牽牛炒頭末

疾熱

牡丹皮 各二錢

方為極細末煉白蜜圓如黍米大用青皮木香葱白入薑少許同煎湯食前服

三白散 治嬰孩小兒解初中腫疾四肢膚囊浮脹大小便不利皆因膀胱蘊熱風濕相乘

桑根白皮 炒

白朮

木通

去皮節

陳皮 去白

白牽牛

半生半炒

甘草

炙各五錢

右咬咀用水煎食前服

母蠣散 治嬰孩小兒外腎腫大莖通明

母蠣粉

方為極細末先以津唾塗腫處次以母蠣粉傅

知腫

外名膀胱內是腎臟一處承受三經所傳其外腎公熱腎白心  
氣主之心經有熱熱入小腸或赤或白或淋或澀心經有寒寒  
流膀胱或秘或泄或腫或光初生見兩箇石子俱大光淨名曰  
如腫一邊差大者曰偏腫蓋由驚氣所行傳受於中或母懷孕  
驚憂之氣不散胞胎之間兒亦受之所以生下便有如腫汁宜  
傳之內用清心順之

里散

黃連

黃芩

大黃

黃蘗各二錢

右同燒存性爲極細末雄猪膽汁蜜同調傳

又方卵照用桃仁去皮尖研極細津唾調傳

### 遺尿

楊氏曰小便者津液小餘也腎主水膀胱為津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿聽裏自出者謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾於所致也

葛氏曰亦有稟受陽氣不足胞冷傳送失度尿出不禁

### 尿床遺溺

膀胱因受冷夜臥必尿床久則遺便溺淋瀝滑小腸

### 偏墜腫硬

陰核腫如吹兒啼怒氣為或因疳積作或被暑邪欺傳上膀胱內侵陵外腎垂停留堅日久結聚一邊

雞腸散

雞腸一具男用雌雞廿二用雄雞燒存性

牡蠣

茯苓土皮

桑螵蛸炒五錢

桂去皮

龍骨各二錢半

右爲極細末仍以雞肚腔一具雞腸一具燒存性研極細末  
每用前藥末一錢用溫酒調化食前服

白濁

楊氏曰小兒尿如白米泔壯由乳哺失節有傷於脾致使清濁  
不分而色白也久則成疳亦心膈大熱熱而得之

小兒夜間尿床有父母不曉人管權機愈重其病殊不知此因  
膀胱冷夜屬陰故小便不禁睡裏自出也至於便濁則有三先

赤後白者心熱也便下純白者肝證也又有年齒稍長而非熱  
非疳亦白濁也此由習毒辨大過或因驚入小  
雖同其治則異隨證用藥

茯苓散 治嬰孩小兒伏熱尿白

三棱炮

蓬莪木

縮砂

赤茯苓

去皮各五錢

青皮

小蘗炒

陳皮

去白

滑石水飛

甘草

炙二錢半

右爲極細末用麥門冬去心燈芯同煎湯調化食前服

香砂圓

治嬰孩小兒小便白濁

香附子

炒一兩

縮砂

去殼五錢

三稜煨

蓬莪木

陳皮

麥蘗炒各四錢

藏書各五錢半

不為極細末煮麵糊圓如黍米大用米飲鹽湯食前服

方用大甘草頭煎湯食前服

疝

按內經太奇論曰腎脉大急沉肝脉大急沉皆為疝心脉搏滑急為心疝肺脉沉搏為肺疝謹疝者寒氣結聚之所為故令臍腹絞痛者是也

巢氏方論謹疝者陰氣積於內復為寒氣所傷榮衛不調一氣虛弱風冷入腹而成故脉經云急者緊也緊則為寒為實為痛血為寒泣音澁則為瘕氣為寒聚則為疝皆因本臟氣虛外感於寒溫內傷於生冷遂使臍腹絞刺激搏而痛無有定處倉卒



之際不堪忍者謂之疝也宜五苓散調沸湯服

癰疽者陰核之氣結腫大而痛也多因小兒啼怒不止動陰氣故陰氣下繫結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此候惟是陰氣不得流行加以風冷入焉血水聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其壯有如李者亦有稀軟者亦有并腎腫大者亦有大硬者疝下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無補法

胎積疝

小兒疝氣每因啼胎積膀胱不散之偏者或左右結成年久不堪醫

疝縮頻啼 膀胱冷熱 疝紅偏疝 刺痛氣相隨

腎外皮焦黑 囊中紫黑瘡 青浮連小腹 何用更堪醫

諸疳原來各有名 蓋因寒濕熱氣侵成 治分五藥烏梅散

勻氣金鈴與五苓

此病從來有兩般 夜啼胎氣要詳看 赤紋虎口為胎疳

青脉端知哭夜間 一搐來時宜速理 莫教驚搐便驚難

膀胱疝氣入腎囊 羞顏疝墜兩分張 此是驚熱嘔逆氣

驚搐孩兒怒毒傷 行有小腸通小氣 莫教虛損不尋漿

更有一般疳裏患 人言獨腎不成雙

臍腹浮青 腎皮焦黑 紫血滿囊 耳中清血 唇黑氣噎

手足心黑

白氣散 治嬰孩小兒調補通利後及冷疝腹痛氣滯不和

桔梗去蘆炒

陳皮

去白五錢縮少去穢

茴香各二錢半

白鹽

炮一錢半甘草炙二錢

右為極細末用滾白湯冷煎服痛燒鹽湯調下前服

烏梅散

治嬰孩小兒腹痛初生臍下冷痛疝氣

烏梅不去核

延胡索

甘草

半生半炙各二錢半

乳香

沒藥

釣藤

各一錢半

前次咀用水煎食前服

金鈴散

治嬰孩小兒疝氣腹痛愈而復作

金鈴子同三錢二錢

二稜

蓬莪朮

醋炙

青皮

去穢炒

陳皮

去白

赤茯苓

去皮各二錢半

茴香二錢半

木香一兩

甘草

炙二錢

檳榔 去脂

枳殼 去穢炒 釣藤

右為極細末用茴香炒研成酒調化食前服不飲酒者尚春

炒煎湯服

金葉圓 治嬰孩小兒冷疝氣痛及膚囊浮腫

金鈴子肉 五錢 吳茱萸 二錢半

右為極細末酒煮麵糊圓如黍米大用鹽湯食前服

川棟圓 治嬰孩小兒疝氣小腹痛引腰脊彎曲身不能直

木香

檳榔 去脂

三稜

蓬莪朮 炮

青皮 去穢炒

陳皮 去白

川棟子 去皮核

芫花

米醋浸炒

巴豆

去心油半錢

桂 去皮

黑薑牛

生各三錢

右爲極細末煮麵糊圓如黍米大用薑湯食前服

淋

楊氏曰諸淋皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏無膏血沙石從水道出焉故有欲出不出淋瀝不斷之壯其甚者塞其間或令人悶絕大凡小腸有氣則小便脹有血則小便澀有熱則小便痛痛者爲血淋不痛者爲尿血敗精結澀爲以敗精敗者爲膏金石結者爲石揣木尋源各從其類治法並用流行滯氣疎利小便清解邪熱調平心火蓋心清則小便自利心平則血不妄行則不可姑息用補氣得補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈盛永遠道不行加之穀道則通關格不通去道其能生者也又腎

虛弱兼中受寒夾冷而小便淋瀝者其證先寒戰而後溲便蓋  
冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而此林鬱氣勝則戰解方得  
便尿也

巢氏病源曰諸淋皆腎虛所致腎與膀胱為表裏至水下入小  
腸通於胞行於陰而為溲腎氣通於陰下流之道也淋有五名  
曰膏曰冷曰熱曰血曰石膏淋見小便有肥脂以膏而浮於小  
便之上此腎虛不能制其肥液而下行也冷淋先戰慄而後小  
便此腎虛而下焦受冷冷氣入胞與正氣交爭故小便澀而戰  
慄熱淋下焦有熱熱氣傳於腎流入於胞其溺黃多而澀間有  
鮮血同來者血淋熱之極也心者血之主外行經絡內行臟腑  
熱盛則妄動常道心與小腸為表裏故下流而入於胞則為血

淋石淋腎主水水結則化為石腎為熱所乘過小便則重車痛  
不得流利痛引小腹則沙石從小便出甚至腰痛令人昏悶遍  
身有汗而後醒此痛之使然也五淋者雖曰腎虛所致然小腸  
為受盛之府氣通於膀胱膀胱為津液之府氣通於腎餘化下  
流而不通者曰腎氣不足熱入膀胱水道澀而不利出入起數  
痛腰急痛蘊作有時或如豆汁膏血用五苓散自然愈也

### 風濕歌

五般淋瀝病相傳 一一須分病本源 若是吐啼傷水積  
或因飲食入脾間 次便因循傳入臟 致令淋病小便乾  
但看眼尾紅筋上 有血相和汗又連 肚上青筋垂至腹  
定知沙石痛難安 掌上乾燥肌皮退 此是風淋定惡泉

外腎不種氣不急 下陰才種氣明運 先與寬腸疎導氣  
定知腎經可安痊

血淋尿血

又熱膀胱內 胞中積聚成 小便時下血 澁少痛干心

熱淋結澁

三焦因有熱 熱聚入膀胱 結澁陰串痛 淋漓弱色黃

石淋沙石

膀胱并腎熱 小水胞中結 似石或如沙 澁痛溺難洩

氣淋頻澁

寒氣膀胱內 尿難澁又頻 腎虛胞又冷 水道不熱澁

寒淋如膏



林瀝脂膏水

胞寒腎氣虛

弱頻精液耗

白濁又難除

水泉不止

水泉頻不止

胞內不收藏

冷滑難禁

亡精耗小腸

淋病雖然分五種

要明各類在詳看

曰膏曰冷同其證

血不均為熱一般

小兒淋瀝膀胱熱

風滯氣澁小腸結

胎中積聚沙石淋

熱結氣攻小便止

小兒淋瀝成難忍

冷熱須分色數般

小腹刺痛常結閉

腰間急脹豈能寬

或如膏色兼膿色

有似黃棉若米泔

腎縮黑青心撮痛

便投靈藥亦難安

外黑裏縮

臍下清淨

鼓滿額裂

湊心唇黑

頭軟腰折

口開氣冷

五淋散

赤茯苓 去皮

赤芍藥 炒

山梔子 去殼

甘草 生

當歸 去蘆

黃芩 炒

車前子

淡竹葉

絲子

木通 去皮節

滑石 水飛

葵子

葶藶 炒

右取用葱白一握煎入車前草杆搗取汁用五苓散調化

食前服或硝石末調化服 血淋白茅根燈蘂煎湯服

有氣淋小腹脹滿尿後有餘瀝末通煎湯服 熱淋小便

赤而淋瀝臍下痛新水煎服或蓄本煎湯服 石淋莖肉

痛尿澀有沙石令人悶絕砂石膈紙炒焦爲細末葵子煎湯服

葵子散 治嬰孩小兒諸淋

葵子

車前子

木通

去皮節

蘼麥

桑根白皮炒

赤茯苓

去皮

山梔

去殼

甘草

炙

石劉散用井水葱白二寸煎食前服

草豆湯

治嬰孩小兒沙石淋

甘草

一寸生

黑豆

一斤二十粒

右艾咀用新水煮棄熱入滑石末煎食前服

阮氏方

治熱淋

六田螺十五箇新水養候螺中出泥澄去上清水以  
底下泥入臙粉調金臙上尿即通將田螺放去流水  
中若殺之病不得愈

尿血方

蒲黃生

地黃生

赤茯苓去皮

甘草生

右剉散用水煎入人髮灰調化食前服

又方小便出血生地黃汁生薑汁入生蜜同調化食前服

小腸氣痛

小腸氣痛腰先曲 無淚叫啼空眼哭 口乾脚冷二唇乾

額上汗珠濕漉漉

木香飲

治嬰孩小兒小腸氣痛

川棟子

上箇巴豆七粒炒令黃  
色去巴豆入前香半兩 玄胡

南木香

二錢

史君子

右爲極細末用米飲食前調服

脫肛

脉訣曰大腸其腑爲傳送蓋肺與大腸爲表裏肺者大腸之明  
肺實熱則閉結不通肺虛寒則腸出露有因痢久裏急後重  
努力肛開爲外風所吹或伏暑泄瀉腸頭不禁或稟賦怯弱易  
於感冷亦致大腸虛脫小兒所患泄瀉者因暑濕風熱乘脾而  
得蓋風屬木木勝則制土土主脾胃虛而受制入濕喜傷脾因  
虛受濕不能分別清濁水穀交雜則爲洞泄洞泄既久大腸亦

虛大腸乃平陽明燥金而土虛不能生金金氣既虛則傳送之  
道亦虛又爲風火所襲故肛門脫而不收法宜補脾溫胃使金  
得受丹之益而氣實平胃散主之次則內投固腸之劑其肛門  
色紅而軟肺脉浮數右手指紋紫見身微有熱時或煩燥難經  
曰出者爲虛入者爲實

楊氏曰惟實則滿溫則內氣充而有所蓄惟虛則寒寒則內氣  
餒而不能收視大腸之厚薄膏脂之肥瘠內氣之虛實何如爾  
凡治脫肛先以溫湯澆軟漸漸納入及小兒啼叫聚氣久痢不  
止風邪襲虛亦有此證

肛腸脫出

肛頭頻自下

因利滑難收

秋後經時日

今傷痛不休

脫肛瀉血積因傷 冷熱攻脾作滑腸 消渴口乾焦上熱

氣攻虛腫面青黃

肛門出露久難收 再感風傷事可憂 況自先傳脾胃弱

更詳冷熱易為瘳

本因良藥過於涼 冷氣從而入大腸 只看鼻根青脉見

更兼唇白齒根黃

凡腸頭作痔即是有蟲用生艾川棟根煎湯薰洗

龍骨散 治嬰孩小兒大腸虛肛門脫出

龍骨二錢半 訶子煨去核 次石子二錢

赤石脂 罌粟殼去毛帶穢醋炒各二錢

右為極細末用米飲調化食前服

蟾龍散

治嬰孩小兒陽證脫肛

此龍蟠

錢樣者上上一兩

朴

右為極細末凡四濕潤乾修思處乾燥用清油調塗先以見  
產清劑芥生葱熨湯溫浴洗輕與拭乾然後傳藥

伏龍肝散

治嬰孩小兒陰證脫肛

伏龍肝 一兩

龜頭骨 五錢

一兩藥煎一二錢半

右為極細末用紫蘇煎濃湯候溫清酒同調傳

赤石脂散

治嬰孩小兒瀉痢後肛門不收

赤石脂

伏龍肝 各一錢

右為極細末腸頭上傳

又方

蒲黃五錢猪脂一兩煉猪脂同蒲黃成膏塗腸頭



汗

楊氏曰汗者血之異名陽主氣氣爲衛陰主血血爲榮人之一身有陰抱陽平則寧偏則病陰虛陽必走故發熱汗出如水熱而湧陽虛陰必乘故發厥汗出如水蓋而流汗者氣虛而津液爲之發泄也人以衛氣固其表所以溫肌肉充皮膚肥腠理明理論曰津液湊注之初爲腠之理縫會之中爲理司開闔衛氣一虛則肌肉不溫皮膚不充腠理不肥開闔不也明理論曰自汗者謂不因發散或昏或睡自然而出盜汗者睡困則出醒則復收頭汗者邪搏諸陽津液上湊則汗出頭上手足汗者胃主四肢陽明之證無汗者寒中榮則無汗謂湊理閉也

汗者心之液也。脉訣曰：液汗通皮，潤聲言。要氣清，蓋人之氣，猶水火也。平則寧，偏則病。陰虛陽必湊，則發熱；自汗陽虛，陰心乘則發厥。自汗小兒脾虛，自汗多出額上，沾粘人手，速救胃氣，用全蝎觀音散治之。

小兒盜汗，由冷食熱水傷脾土，為水傷不能制其津液，故成汗。自出汗者，心之液，或心虛驚，恐血不足而汗先當收斂，心氣有遇夜而睡中汗出者，名曰盜汗。

小兒盜汗者，因食冷物過度，或熱水淘飯，大能損脾土，為水之所傷，則不能制其津液，故成汗自出也。

夫盜汗者，心之液也。小兒血氣嫩弱，膚腠未密，若厚衣溫暖，熏蒸臟腑，生熱搏於心，心為邪所勝，故夜不能內藏，薰出肌膚。

則爲盜汗也又或傷於冷傷於熱冷熱交爭陰陽不順津液洩越亦令睡中汗自出其間有虛實之證虛者謂諸病後或大汗後血氣尚弱液溢自汗實者或潮熱成寒熱發過之後身涼自汗二者日久令人黃瘦失治則變爲骨蒸疰勞也

巢元方論曰病因睡寐中而自汗流此因陽虛所致久不已者令人羸瘠枯瘦心氣不足津液妄出故也

### 自汗

血不榮則神不備氣不衛則人脈不充理其血用和其氣安其神用調其脉陰陽均平氣血相參百脉流順三焦五臟自然以充其脉凡初生至周歲之元不可自汗自汗即亡陽亡陽即氣怯氣怯即脉虛脉虛則神散神散即驚風有作驚風已作搐搦

病爲醫士失之究竟血不榮氣不衛作疾不輕爲害必大禍生  
起於微人事回不察庸工反笑之曰自汗豈能成風癰耶愚曰  
奈其知其所已然者非我友也舉此一端虛以類之智者應有  
誚云觀其瀾而探其海知其末須明其本通變之士審乎得失  
是是非非不離乎中裁度踈謹而後已瘰乳幻自汗切勿止之  
方用白朮一分小麥一撮水煎令乾去麥爲末黃耆煎湯調服  
以愈爲息若以止汗反爲閉氣作熱煩燥所謂氣血相參則汗  
自止矣

盜汗如珠

才睡汗如珠 夜多日晝無 亡津添骨熱 面色燥皮膚

虛熱盜汗

盜汗類氣受傷 臟中虛熱小便黃 夜間潮熱無時節  
頰赤唇青有口瘡

小兒自汗證多端 切莫將爲一例看 要識陰陽虛實候  
勤勤調理自然安

團參湯 治嬰孩小兒虛汗盜汗心血液盛并發爲汗收斂心  
氣

人參 去蘆

當歸 去蘆炒各二錢

右剉散用雄猪心一箇切三片每服二錢猪心一片井水同  
煎食遠服一方加黃耆蜜炙二錢

牡蠣散 治嬰孩小兒自汗

牡蠣

黃耆 蜜炙

生地黃

右以咀入浮麥麻黃根同煎食前服

出汗散

人參 去蘆

白朮

茯苓 去蘆

黃耆 蜜炙

當歸 去蘆片

甘草 炙各一錢

右以咀用生薑三片入麥麴同煎食前服

又方

白朮 五錢

小麥一撮水煮乾去麥白朮杵極細

末用黃耆煎湯食前服

陳汗方

牡蠣

麻黃根

赤石脂

糯米粉

具母

方為極細末綿包藥撲汗

腫

全生方曰由小兒臟腑嬌嫩乳母過傷脾胃虛冷不能消化乳食停滯腹間脾受積傷衰弱不能制水故流溢漬於脾膚腫有三證疳水積水驚水也

疳水者心中虛腫

積水者五積在腹結化為水其候或冷或熱四肢頭面俱浮若面浮作虛中積治宜補而後取

驚水者前後重疊驚致令心火熾瀉飲水過多停積於脾其候四肢腫身上熱脉訣曰水氣浮大得延生沉細應當是死別尺脉如系或浮洪按之無根乃絕脉

楊氏曰古洛陽以腫於癰疾則知病之危惡非他疾比也夫人  
全性命者水穀而已則腎主之上穀則脾主之惟腎虛不能行  
水脾虛不能制水胃與脾合氣傳為水穀之海因虛而不能傳  
化故腎水泛溢浸漬脾上於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮  
膚注於肌肉而發腫矣其候目胞上下微腫四肢腫着咳喘怔  
忡股間清冷小便澁黃皮黃薄而光手按成窠舉手則滿  
楊氏曰身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下次  
則通利小便順氣和脾不可緩也然證雖可下當審其虛實確  
其輕重不可過用芫花甘遂大戟猛烈之劑用之大過吾恐峻  
決者易固閉者難水氣復聚何以治之

凡虛腫先起於腹而散於四肢者可活先自四肢而後歸腹者



不治蟲脹肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘕而轉作虛浮及唇  
黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足平傷腎背平傷肺男爲足腫  
而上女從身腫而下或肉硬或手掌平皆不治

經云諸有水自下必微腫又頭面腫曰風腳腫曰水

朱氏曰腫因積而得既取積而腫再作小便不利若再用利小  
便藥性寒而小便愈不通到此則束手蓋中焦下焦不升降爲  
風寒痞膈故水凝而不通服沉附湯則小便自通喘滿自愈方  
小通用久服無礙

腫脹二證皆由臟腑怯弱榮衛不順三焦壅滯表裏俱虛虛中  
有積久患失治虛虛不能傳化水氣滲泄經絡脾得之氣溢皮  
膚而腫入臟而受能最重要急當明其因受濕腫脾胃受濕冷

不尅氣浮四肢面目皆腫此由脾虛止調胃補脾然後去腫先服理中湯傷寒下之早來虛人腹作腫理中湯加枳實作喘加豆豉食難傷脾胃傷冷積致腫瀉痢久脾氣虛致腫先正氣調胃氣虛腫亦名氣蠱血虛腫亦名血蠱禁衛俱虛腫亦名血氣蠱先服禁衛飲子次分氣飲子已上七證先明所因用禁衛飲子至穩若是水腫或受濕以利小便切不可動大腫蓋腫脹已出脾虛若下之愈見脾弱也

原腫病之標本之疾腎主元氣天一之水主焉肺主沖化地四之金主焉腎為本而肺為標地至陰以積水其為病也腎者胃之關鍵關鍵不利樞機不轉水乃不行滲於脉絡皮膚而為浮腫當推究內外所因而為施治兒大者憑脉以明虛實古方有

十種論證知氣不得卧而心水兩脇緊痛爲肝水大便鳴漉爲  
肺水四肢若重爲脾水腰痛足冷爲腎水口苦咽乾爲膽水乍  
虛乍實爲大腸水腹急肢瘦爲膀胱水小便秘澀爲胃水小腹  
急滿爲小腸水然脉浮爲風爲虛沉浮爲水病沉則脉絡虛伏  
則小便難卽爲正水脾脉虛大多作脾腫因循不治乃成水腫  
蓋脾屬土喜燥而惡濕當感濕氣濕善傷脾血化爲水土敗不  
能制水則停蓄不行留滯皮膚故作浮腫初得病時見眼泡早  
晨浮突至午後稍消以羌活散疎解次醒脾散主之此證夏與  
秋冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如春水泛溢蓋肝木  
旺而脾土受尅不能勝水所以難療進退不常須慢調卽忌鹽  
醬薑酢油麵皆味鹹能溢水者併其他生冷毒物亦戒重則半

戒輕者二日脾胃平復腫消氣  
消狀後於飲食中旋以  
投則其疾自不再作

劉氏曰治腫非易補養尤難  
忌者切須詳審

鄭氏方引千金云從腰以下腫  
當利大便腰以上腫當以發汗  
內經云開鬼門也潔淨府  
小平治權衡以平為期也

### 疔腫明亮

虛黃如熟李 柑水定無疑  
氣聚膀胱內 陰囊腫似吹

### 風腫多痒

臁腫時時痒 風邪客肺皮  
搔之成瘡廔 痰熱互相蒸

### 氣腫因嗽

久嗽胸浮腫 因勞肺氣焦  
痰停胸膈滿 延喘不相宜

虛腫煩渴

久痢損傷脾 脾虛腫四肢 渴煩多畏食 臍凸滿將危  
遍身浮紫黑 喘促渴煩加 自似黃槐色 皮膚斑若麻  
臍邊青腫出 外腎脹如八 諸腫逢斯證 堪堪命若賒  
古今議腫是脾虛 大抵多從濕熱為 十種根因名調理  
詳分補 在臨機

皮肉紫腫 臍出青黑 自利黃泡 腹虛如泡 小便不禁  
滿面血 氣逆不通 胸腹頭陷 唇縮枯澀  
禁衛飲子 治嬰孩小兒調補氣血俱虛四肢頭面手足浮腫  
以致喘急

當歸 去蘆

熟地黃

人參 去蘆

茯苓 去皮

川芎

白朮

甘草 炙

芍藥 炒

枳殼 去穢麴炒

陳皮 去白

黃耆 蜜炙各一錢

右為極細末或水煎不拘時候服

分氣飲子 治嬰孩小兒調理腫脹作喘氣短促急坐卧不任四肢浮腫飲食吐逆神困喜睡

五味子

桔梗 去穢炒

茯苓 去皮

甘草 炙

陳皮 去白

桑根白皮 蜜炙

草薢 去殼

大腹皮

白朮

當歸 去蘆炒

紫蘇

枳殼 去穢麴炒

蘇子 炒

半夏麴

右以咀用生薑一片棗一箇去核同煎不拘時候服

沉附湯

附子

生去皮

切片二錢

右剉散用生薑五片入沉香一錢磨水同煎食前服

內消圓

治嬰孩小兒頭面手脚虛浮

橘用青湯浸去穢五箇

巴豆

去皮心膜油七箇

木香炮一錢

防己

一錢半

丁香

十四箇

右青橘巴豆同炒蒼色去巴豆不用為極細末蒸餅圓如黍

米大男用陳皮煎湯女用艾葉煎湯食前服

塌氣圓

治嬰孩小兒乳食不化腹脹氣急浮腫

巴豆

十片

胡椒

十粒

丁香

十箇

青橘餅一餅不長長每箇入豆半

右用礬木醋一梳煮青橘醋乾取出細切青橘同諸藥焙乾

為極細末粟米煮糊圓如黍米大用米飲食則服

葶藶散 治嬰孩小兒水氣腫滿

葶藶 桑根白皮 黑牽牛

檳榔 去脂 大黃 各二錢

右為極細末用生薑三片蜜半匙同煎食前服

消渴

大渴者有大渴熱渴疳渴三者大同小異大渴起於吐瀉之後  
脾胃因虛而生邪熱脾受邪熱延夜內澀唇乾舌燥故成大渴  
也熱渴起於血氣盛實臟腑之熱或冒暑毒因熱熱燥津液不



生瘰癧舌乾故成熱渴也

巢氏云渴而飲不止小便澀者則成瘰癧

瘰癧渴者起於腎

與膀胱好食肥膩恣食其酸骨熱盜汗黃瘦腹脹口臭唇乾故

成瘰癧飲水多小便無度其病久則多發癰疽巢氏云其病久

則發癰疽或變腫病實鑑云腸虛土壤不尅小便為腫病在於

皮其渴內熱則小便利則津液竭津液竭則經絡澁經絡澁則

榮衛不行榮衛不行則血氣流溢故成疽也其渴久則脾土虛

脾土虛則腎水盛腎水盛則水反尅土致脾生風濕脾則生虛

熱濕熱相搏故發於皮膚遍身腫滿也

### 渴變成腫

渴頻因火瀉

脾胃並亡津

水飲無乾舌

烟焦又燥唇

眉攢多困倦

髮堅少精神

往非經時日

成虛腫遍身

熱邪極

肺枯津液乾

心胸停燥熱

瘡渴致眩煩

熱水無休歇

皮膚紫黑斑

肚膨加喘腫

士死一生難

白胞黑腫

皮下浮青

氣促如鋸

喉出烟焰

目白黃沉

唇腫白爛

龍粉圓

治嬰孩小兒疳熱煩渴

草龍膽去蘆

定粉炒

黃連炒

烏梅

去核各一錢

右為極細末煉白蜜圓如黍米大用烏梅去核煎湯不拘時

候服

鼻衄

夫鼻衄者是五臟熱結所為也血隨氣行通流臟腑冷熱調和

不失常度無有雍滯亦不流溢血得寒則凝結得熱則流散熱  
乘於血血隨氣發溢出於鼻竅也有因傷寒溫疫諸陽受病不  
得其汗熱毒停聚五臟故從鼻而出也血熱不循經從鼻出血  
隨其氣肺主氣外屬鼻故血也

欲衄之候脉弦洪 鼻內乾燥似蟬風 五臟積熱壯熱  
墜氣積血在肺中 出之數合宜醫治 若須斗升命必終  
人若重病神效 清肺涼血有奇功  
龍黃湯

川芎

生地黄

赤芍藥

當歸 去蘆

蒲黃 少許

右咬咀用水煎不拘時候服

春月生地黄取汁少糖用井水調化含遠服

夏秋月車前草洗淨取汁生薑汁入蜜一小匙調化先以淨水  
鼻次以井水澆汁服地黄湯若傷寒證小柴胡湯入生地黄煎  
服

鼻衄方用生蘿蔔汁仰頭滴下豈飲汁

### 吐血

夫吐血證者由於衛氣逆也榮者血也衛者氣也榮衛相濟不  
失常道一有所盛則致妄行血者水也決之東則東流決之西  
則西流氣之使血其勢如此

巢氏云吐血者是有熱氣盛而血虛熱乘於血性得熱則流散  
妄行氣逆則血隨氣上故令吐血也或飲食大飽之後脾胃內

冷不能消化忽吐所食之物氣血相衝因傷脾胃亦令吐血又嗽氣逆面目浮腫而嗽吐血者是肺虛損也

小兒九道出血何爲而然蓋人之所有者血與氣也心者血之主肺者氣之主氣主呵之血主濡之榮養百骸灌漑係脉升降上下榮衛諸和自然順適一或不調疾由生矣或外爲六淫所浸內因七情所迫氣乃流而不行血乃壅而不濡內外抑鬱不能流注以榮於身必有妄動之患

叔和以凡脉爲失血之義在上者爲陽故也陽明主乎多氣多血未有不因熱而得蓋氣血俱熱無鬱內通失其常度是以其行有在強裸也此證者因非虛而所傷皆乳母執着不自寬釋及啖辛辣之味流於乳絡以飲之後停滯不散鬱蒸於內亦能

動血或居重傷或關火氣重  
諸不令常見風日積溫成熱熱極  
則湧泄或吐或衄或大小便  
亦多血來者

吐血氣逆

血虛氣逆不和同  
熱毒流心引肺風  
忽發風眩驚悸逆

吐出鮮明點紅

九道何為妄血行  
蓋因拘鬱熱邪生  
隨經施治明虛實

氣順如常血自勻

便血

兒生七日之內大小便有血  
出者由胎氣熱盛或母食酒麪炙  
煖鹹醃流入心肺在胎受之  
熱毒亦傳心肺且女之臟其熱即  
入心故小便有之男之臟其熱即入肺故大便有之或淡如垠

水或血加鮮又不可謂熱過服涼劑其血愈只以生地黃根取汁五七匙酒半匙蜜半匙同和勻食遠服

夫大便秘者是大腸乾結損傷胃氣也臟氣既傷風邪自入或痛或熱或積冷或濕毒傳於脾胃滯濕互作致動血氣停滯於血中又有腹脹冷氣在內攻客入脾胃或瘀血腸濕毒下上焦心肺積熱流注大腸亦血虛其人必肌腠萎黃頭暈不黑矣

### 大便下血

風火腸間火熱致交相繫上糞須紅下瘡傷臟腑令便血錢氏

云筋中為血而瘦孫氏一熱毒發停於胃中古書云心經有熱  
二痛傷心肺膈中下血毒血下如赤豆汁

皮膠散 治嬰孩小兒吐下血

阿膠炒 蛤粉各一錢 辰砂水飛少

右為極細末用藕汁入白蜜調化食遠服

方 藕節曬乾為極細末用人參去蘆白蜜同煎湯調化食

遠服能消瘀血

五疳圓 治嬰孩小兒大便下血腸風臟毒

五疳子

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用米飲研化食前服

小便出血

夫小便者蓋心主血與小腸相合血之流行周遍經絡循行



腑若熱聚膀胱血滲入胞故小便出血也

蒲黃散 治嬰孩小兒吐血咯血下血

蒲黃生 油頭髮灰各一錢

石為極細末用生地黃汁或米飲調化食前服

槐花散 治嬰孩小兒熱便血

荆芥穗 槐花 枳殼去穢麩炒

甘草生各一錢

右為極細末用白蜜煎湯調化食前服

三效散 治嬰孩小兒糞前後血下腸風下血

糞前血石榴皮末用煎枝煎湯調化食前服

糞後血五倍子末用艾葉煎湯調化食前服

糞夾血或腸風下血和蒸燒赤存性爲末用米飲調化食前服

龜胸

胸高脹滿其壯如龜此肺經受熱所致也乳母酒麪無度或夏月熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此疾保幼須知乳母常担去宿乳夏者洗乳令淨担去熱乳恐傷肺肺氣胸膈脹滿令兒如龜胸也

常論此候因風痰停飲聚積心胸再感風熱肺爲諸臟華蓋居於膈上水氣泛溢則肺爲之浮日久疑而爲痰停滯心胸無以風熱內發其外證唇紅面赤咳嗽喘促致胸膈高如覆掌名曰龜胸服藥後而復作傳變目睛俱視痰涎上壅難以發搖難治

無端唇口忽然紅 心肺因痰飲聚中 風熱乘之加喘急

形如覆掌號龜胸

龜胸散

大黃煨二分 天門冬 去心 百合

杏仁 麩麩炒 水通 云節 枳殼麩麩炒

桑根白皮 蜜炙 甜葶藶 紙炒 朴硝 冬五錢

右為極細末煉白蜜圓如芡實大用溫湯研化食後服

龜背

兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦致

匾樓背高如龜背矣然此多成痼疾

龜背者蓋初生未滿半周強令坐早客風吹着脊脊傳入於髓

嬰兒背高如龜之壯名曰龜背終成痼疾

和穀防風圓

枳殼去穢麩炒

防風去蘆義

獨活去蘆

太黃煨

前胡去蘆

當歸去蘆炒

麻黃去節各一錢

右爲極細末煮麩糊圓如黍米大用米飲食後服

語遲

保嬰須知言心聲也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒感受母氣心官不守舌本不通四五歲長大而不能言也

葛蒲圓

人參去蘆

石菖蒲

麥門冬去心

遠志去心

川芎

當歸去蘆

乳香

朱砂水飛各一錢

右為極細末煉白蜜圓如黍米大用米飲食後服

又方杜壇餘脂酒飲

齒遲

聶氏云稟受腎氣不足者即髓不強無膏之所經而為髓不足故不能兄於齒不生也

芎黃散

川芎五錢

山藥

當歸去蘆炒

芍藥炒

甘草炙各一錢半

右為極細末用白湯調化食後服空心末擦齒根

三香檀榔圓 治嬰孩小兒稟受腎氣不足腎主骨髓髓不充於齒故齒不生

香附子炒

沉香各二錢

檀榔去穢

人參

去蘊各二錢半

麝香

少許

蝦蟇

燒灰二錢半

右為極細末羊髓煮爛圓如黍米大用米飲食後服

髮渥

本草方兒稟受血氣不足不能榮於髮故頭髮不生或者呼之為疳病疳也

香粉膏

香需一兩

胡粉五錢

猪脂二錢半

方用水一小鍾煎香需取汁三分入胡粉猪脂調勻頭上塗

一日三次

行遲

羅氏云兒生至周歲三百六十日膝骨成乃能行也近世小兒多因父母氣血虛弱故胎氣不強骨氣軟弱故不能行也骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行抑亦肝腎俱虛得之肝主筋筋弱而不能行也

錢氏補腎地黃圓  
鹿茸半膝五加皮酒炙服髓生而骨強即能漸漸行也

虎骨圓

虎脰骨

酒炙

生炙

地黃

去皮

茯苓

去皮

酸棗仁

酒炙

去桂

去皮

防風

去蘆

當歸去蘆

川芎

牛膝酒浸去蘆

石為極細末煉以蜜圓如黍米大用木瓜煎湯食前服

五加皮散 治嬰孩小兒三歲不能行

五加皮 二錢半 木瓜 一錢二分半

右為極細末用粥飲入酒二點調化食前服

調元散 治嬰孩小兒稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦

大如臆致語遲行遲手足如箇神色昏慢齒生遲

山藥 五錢

人參去蘆

茯苓去皮

茯神去木皮

白朮

芍藥炒

熟地黃

當歸去蘆炒

黃耆蜜炙各二錢半

川芎

甘草炙各錢半

石黃耆一錢



右劉散用生薑三片棗一箇去核同煎不拘時候服如嬰孩  
幼乳母同服

雜證

長大不語 心氣不足

長齒不出 受胎父氣不足

長髮不出 受胎母氣不足

長大不行 腎肝不足

手攣不展 肝氣不足

腳攣不展 腎肝氣不足

三不治法

二者內實而表虛腹痛滿大小便不通心下牢強手足煩熱者

脉細數而乾嘔無水出者死候也

二者內虛而表實內熱而吐下清飢聚者虛也脉洪大者必死

候也

三者內外俱虛身躄空而汗出如珠微吐嘔而虛煩脉厥逆身不安靜必死候也

五絕

口定筋癆肝腎傷四月虛乾逆而青黃心絕不言魚口禁喘急腸虛肝受殃

警省

證候不明醫之過也固敢不良士之繆也去醫裁藥審證察候猶若權衡以究標本醫藥純全之道調理小兒雜病須究其五臟所傳及至變作也患殊失源流迷而不反所以作疾故述詳悉

小兒平常服藥過多頑玩臟腑調和之劑不愈則易之以攻

固守之劑太過則時乎而疏利主治在我不可不問源流不可  
偏徇病家所欲圓機達變消息輕重而應之是通變之不可無  
法也大槩小兒臟腑柔嫩易虛易實易冷易熱兒有大小壯弱  
病有輕重淺深所貴乎目視指切意度心推醫權經術斟酌對  
證調治

# 瘰癧諸

小兒瘰癧之由皆始生之時啼聲一發口中所含惡血隨吸而下遂於右腎內經之包中其瘰之發下焦相火熾也三等之斑皆出於足太陽寒水之經外爲大寒內爲二火交攻化血肉爲膿寒爲發寒邪可令內瀉一火又令濕氣上歸本位一二服斑瘰即愈已後再無一番斑出之患而損主命實矣

小兒斑瘰始出之證必先見面煩躁赤目眵赤則火煩悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴足稍冷多睡驚風者瘰之證或生膿胞或生小水斑或生癰瘰此三等不同蓋諸證皆太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊並流上頭下額逆手太陽丙火不得傳導達于面上是壬癸寒水逆赴丙火熱火故也

痘疹受病之由

小兒在胎之時乃母五臟所養成形也其母不忌禁忌恣意所欲加添滋味好啖辛酸或食毒物其氣傳於胎胞之中所以小兒在胎胞之時受得此毒名曰三穢液毒今痘疹者是三穢液毒所出也

一者五臟六腑穢液之毒發為水痘瘡

二者皮膜筋肉穢液之毒發為膿水痘瘡

三者氣血骨髓穢液之毒發為膿血水痘瘡

二者既出發為癰痘瘡也子母當慎口即不可食葱韭薤蒜酒醋塩醬穢穢兔雞犬羊及河海蟲魚腥等味世俗未曉將爲食藥往往不顧其後悞傷者多矣

世以爲瘡之始也

其書不載或云建武中於南陽征  
廣新得此瘡瘡次而大小兒相繼傳染爲受虜之疫氣故也  
後世明醫經方始說瘡痘斑疹龐氏云天行豌豆瘡自漢魏以  
前經方不載或云建武中於南陽征虜所得呼爲虜瘡考之於  
史建武乃

光武年自光武至魏相去一百九十五年則是起於東漢也龐  
氏兼言漢魏能無疑乎蓋小兒瘡痘是把質成形在胎食母血  
穢何以知之兒生下不食乳前古今以黃連汁飲一二日下胎  
穢前以此觀之胎中食穢則尖出腹哺養才落則燕下血穢坐  
婆急拭口中冷淨兒生由病同胎養而下唯血穢之氣存焉錢

氏云餘氣入兒臟中本因傷寒入兒成痘瘡因傷寒時氣或積  
熱潮熱運動穢氣入於五臟其毒當出譬之荒野草木無根而  
生者蓋受地土之氣也小兒瘡痘因熱而生者蓋受胎穢之氣  
也五臟受穢氣多則出盛少則出稀無臟則相雜出兒稟氣虛  
則出早氣實則出晚如地虛則萌芽早發實則遲也穢氣入肝  
則淚目感則爲水泡色澤微青以應肝之象入心與血相感則  
爲瘡子色赤深紅以應心之象入脾與涎相感則爲癰子色赤  
黃淺以應脾之象爲鼻血故色赤黃淺也以應脾之象入肺與  
涕相感則爲膿子色白而肥以應肺之象腎主骨生髮故其  
髮黑而潤不脫髮者不脫髮者不脫髮者不脫髮者不脫髮者  
不脫髮者不脫髮者不脫髮者不脫髮者不脫髮者不脫髮者

腎旺多作寒顛禁牙之證其瘡發出五臟先有證候各有時辰  
錢氏云河欠顛悶肝也時發驚悸心也午熱雀涼脾也頰赤噤  
噤肺也寒顛禁牙腎也

道書曰寅卯屬肝巳午屬心申酉屬肺亥子屬腎辰戌丑未屬  
脾五臟之氣皆與時辰相合也

### 檢五臟所出瘡

肝

出為水泡其氣旺在寅卯

心

出為赤斑其氣旺在巳午

脾

出為癰子其氣旺在辰戌丑未

肺

出為膿血癰其氣旺在申酉

腎

主瘡黑色其氣旺在亥子

假如小兒寅卯時發潮熱來日依時或三日依時蓋肝旺於寅  
卯因潮熱而運動肝氣故隨臟而出必知水泡也錢氏云自寅



至午皆心肝用事脉經云其旺日甲乙旺旺時平旦日出如巳  
午時發潮熱來日依時必出斑子也若辰戌丑未時內占一時  
發熱來日又占一時復作者必知出痧子也如申酉時復作潮  
熱本屬肺臟來日却在寅卯時發熱不依次第必知膿痍水疱  
相雜而出餘皆效此推之腎之在下不受穢氣惟內虛多歸於  
腎變黑色難治也凡瘡痘欲出先見於頭面難經曰諸陽皆會  
於頭錢氏云瘡痘屬陽出則爲順素問云春陽上升故知先出  
於頭面也瘡痘者是小兒大難不可不爲詳審也

四藏有證腎獨無證

小兒在胎含濁穢以養五臟生下則其證當出痘出之時其證  
悉見呵欠頓悶也午京午熱足冷多睡也時發驚悸也

赤脈打噴嚏惟腎在腑下不受穢濁獨無其證腎之平證耳  
屍蓋耳尻俱屬腎屬水又居於下右瘡黑陷而下尻反熱乃變  
壞歸腎其證如此

痘瘡熱諸熱不同

小兒痘瘡其初不免乎發熱臨病之際不可不審一藥用藥鮮  
不敗事今列于后以便後學

傷寒熱手足稍微冷發熱惡寒而無汗面色青慘而不舒  
左額有青紋

傷風熱手足稍微溫發目汗面赤而光

傷食熱目胞腫右額有青紋身熱而頭額腹肚最甚但熱

晝涼而黃或吐泄腹疼

驚風熱面色青紅額正下有青紋手心有汗時作驚惕手

脉絡微動而發熱

風熱身熱倍能食唇紅目赤大小便秘

潮熱如水之潮依時而退

痘清熱心有四臟之證山冷中指冷尻冷

潮熱

谷空響應形動影隨舉此而彼也痘瘡發熱者其潮熱之時可知何臟發出

寅卯辰時潮熱傷肝 出水疱

巳午未時潮熱傷心 出斑瘡

申酉戌時潮熱傷肺 出膿疱

亥子之時潮熱屬脾 常出疹

獨腎無證

辨證

人稟天地理氣要元氣盛壯論語註云肉氣不可勝穀氣穀氣不可勝元氣人身氣血相乘環轉頂是氣旺和血氣和人安血敗氣弱則疾生小兒痘瘡將出肌腠至熱得氣壯出長皆齊紋疤易入譬如春種十餘日方出夏止五六日即長為何氣盛然也瘡出猶火熾若下涼劑如水投火必傷其和又如痘瘡出長皆齊或小兒喫涼物便減元氣若水減火力氣軀前弱身反加熱致瘡透入不曉者再服溫涼藥則臟冷瀉其命傾矣經云氣亡神滅出瘡當忌涼藥可也

聖藥寶鑑云癰疽是臟腑俱熱發於皮膚爲之熱在腑發之即  
瘰癧在臟發之即疽未發同一治未出可下解熱而退既出忌  
勿下及冷藥逼之其病不出在裏害人

癰疽之病首尾證平下之者誤首尾有實熱證不下者誤切不可用巴豆圓子無下之此藥乃攻食積出活人書首尾有虛寒  
證不補者誤癰疽出透色澤紅證平者不須服藥如證候平  
穩強施湯藥殺小兒也大抵治病之法對證用藥有是證服是  
藥順其證則生違之則死此而昭然

### 斷治痘疹

寶鑑云癰疽是臟腑積熱發於皮膚爲之熱在腑發之即瘰癧  
在臟發之即疽未發同一治未出可下解熱藥惟此言甚詳誠

可信也

論瘡痘約日訣

小兒瘡痘者與傷寒相類或安或危或見或隱皆六七日之間  
歸證明矣凡瘡欲出先發熱輕者三四日次者五日遠者不過  
七日此約法也一日太陽傳膀胱二日陽明傳胃三日少陽傳  
膽四日太陰傳脾五日少陰傳腎六日厥陰傳脾七日還經傳  
遍五臟六腑故七日而止也有小兒因傷寒至七日後或已汗  
或未汗或吐下後熱不除此毒氣盛而未發熱毒入胃發於皮  
膚成斑者壯如蚊蚤所啣赤斑十生一死黑斑十死一生及有  
胃熱發黃者壯如橘色下利者死又有成癰癰或白泡者此皆  
傷寒熱毒不除多變此疾也巢氏云發斑不可用發汗藥

春夏爲順秋冬爲逆

經云春夏陽氣在上人氣亦在上秋冬陽氣在下人氣亦在下  
今痘瘡之發自裏達表當春夏之時則血氣隨陽氣而上運而  
行疾秋冬則血氣隨陽氣而下陷而行遲是以發於春夏者順  
秋冬者逆又當論小兒稟受充實堪耐寒暑則令變更不以爲  
事雖發於秋冬亦不爲害受氣怯弱者寒暑易節便生疾病雖  
發於春夏未可言爲順也

順候

春夏爲順先發搐而後發痘者生先發熱大便如常其瘡紅活  
乳食如常

逆候

秋久爲逆春膿痂枯乾夏黑陷秋斑欬冬瘡土氣已出

而膿汗不止者惡候病瘥後必驚者危病正出而吐痢者

明便血而乳食不化者死脾虛也瀉血而瘡爛無膿者死

大小便秘目閉殼脫肌肉黑者死瘡遍身黑陷目閉無魂

者面色青黑色病不相應者逆或因吐瀉內虛而爲陷伏

或因已出妄汗表虛而成痂爛或因冒犯風邪而成倒靨

或因穢惡觸忤而成黑陷耳尻反熱其瘡青紫變壞歸腎面

黑或有黑氣不治燥渴小便澀澁瀉瀉不食危瘡成餅塔色

點不出殼啞不治兩目閉黑暗赤昧無魂不治頭面腫瘡

盡抓破或臭爛不可近或足冷至膝不治面腫鼻陷目閉咬

牙不治痘瘡黑焦風攻順頰唇腫項硬或陷高而突不治



瘡毒避忌

腋下狐臭氣俗呼猪狗臭是也

房中淫液氣新房之氣是也

婦人經候氣產後血氣未定等

醉酒暈腥氣聞醉氣痘毒入兒契酒痘毒發出

硫黃蚊藥氣并毒藥之氣硫黃發燭之氣亦日觸之疹病難差

麝香燥穢氣聞麝香即毒入痘丁契則發出

疫汗蒸濕氣錢氏云左右常令存胡荽酒其辟汗氣

烘乾頭髮氣并魚骨諸般臭氣及柴烟入口鼻內

葱蒜韭薤氣煮葱煎薑油烟氣

溝渠濁臭氣孫真人云胡荽酒辟邪氣小兒

已者不復言矣。此等症候。或曰有田舍小兒。任之自然。犯之。手執無幾。何也。蓋貴賤有異。稟受不同也。

瘡痘可畏

不食多渴 渴瀉不食用 滋養散白米散

憂鬱禁牙 能令痘子隱伏是腎旺也

增寒困倦 能令痘子竊伏是脾虛也

煩躁身熱 痘頭者欲生風候

吐逆洩瀉 食不化正出疥痘後大便膿血

瘡作黑坑 內無膿血或黑色痘或先瘡而作黑孔多死

癰疽腫痛 疔毒變疳口臭蝕唇口臭牙落者死

大小便澀三黃圓

喘急痰盛

熱嘔氣喘

或正出或盛或瘵後有此證多死蓋藥食腹中皆死者

已上是瘵痘惡證首尾可畏也除此之外皆不妨內犯其  
一二日但飲食如舊雖困重醫救有可生之理如飲食減  
平日一半者死有飲食如舊內犯其三四亦死

論瘵瘡治法

小兒瘵瘡未出已出之間有類傷寒之狀其瘵瘡病證自然增  
寒壯熱身軀疼痛大便黃稠此乃是正病也若無他證不宜服  
藥

凡瘵瘡疹先分表裏虛實若虛實不分則無所治

如瘰癧俱實者其瘡易出易斂也  
如表實裏虛者其瘡易出難斂也

### 正痘瘡

董氏曰初出如紅點逐旋起脹形如豌豆而結膿窠方結點尤  
而愈

癰瘡 即麻子

王氏曰有熱則易出一出遍於肌膚之上如痛瘡細疱子見而  
便沒

楊氏曰赤疹遇涼而後消白疹遇溫驟而後滅

傷寒熱毒發痘瘡

胡氏曰乃熱在表而失于熱毒蒸發其瘡色白或赤如丹頭帶

白膿者輕根下紫色在肌肉者重此痘疹也

斑毒紋迹

楊氏曰陽證候投溫藥或失汗下陽毒內熱蒸騰外迫毒氣入胃令人發斑其證昏憤關前脉洪大先紅後赤多見於胸腹輕則如癍子重則如錦紋紅者易治黑者難救

紋迹陽脉不洪病人自靜先紅後黃多在手足之間乃紋迹也

丹毒

楊氏曰赤浮肌肉變易五色遊走遍軀

遍認痘疹

楊氏曰方論所載皆以耳冷尻冷中指冷驗之或中或不中以其後有紅脉亦續焉的

黃氏曰宜以紅紙粘貼清油紙以封固必有小紅點如粟起者  
痘證也

謝氏曰忽然發搐但無痰涎不惡風惟惡熱腰痛則腹先出膿  
痘則眼先出熱輕症亦輕熱重痘亦重身熱時不出宜候身涼  
乃出

錢氏曰面黃燥臉唇赤眼瞶黃目胞赤四肢小赤手足冷其尖  
冷尾冷身冷身熱或上涼下熱頭痛腰脊痠痛小便赤少大便  
不通不惡寒惟惡熱皆傷多難必有四臟之證

先發後搐

夾熱壯熱者不可妄投燥藥溫壯瘡發搐者不可妄投寒劑經  
云諸瘡皆出於心火痘瘡雖出於四臟要之心火為之主毒氣

始作未形見之間忽然發搐乃毒氣自心經而出也苟不以外  
證精明之症證必有中指冷四臟之證不以痘證防備之便用  
銀粉已稍難辨不若等劑更心寒肌冷毒氣內陷往往痘瘡之  
初發搐者多因誤服寒藥而死氣絕之際或隱隱斑出已無及  
矣蓋心竅一寒則毒氣陷伏表裏不透況心主一身之血心寒  
則血凝不行痘瘡欲出不可得也且痘瘡發熱必有外證可驗  
又小兒未居女藥素無其苦或爾發搐者痘證也用解表退熱  
消毒快氣利小便藥服之不致誤證待其親證得泄心神亦自  
安矣或有風寒與內熱相搏致疾者各從其證治之但加勻氣  
藥爲妙

張氏曰痘瘡氣勻則出以毒氣勻則榮衛無滯有邪亦散大抵

治驚惟平肝利小便爲第一志也

錢氏曰旺田心所生心主熱而生血熱則生風肝風心火二臟  
交爭而發瘧又曰瘧者脾所生脾虛而肝旺乘之木能勝土熱  
動心神而生驚

必令避穢

木得桂而枯柑得脯而壞物之相畏者如此痘瘡之最穢惡毒  
氣者亦由是也

仲景曰痘瘡欲出宜熾念木仍謹司門戶勿令主人輒入大忌  
狐臭久毋房事月婦經水穢觸動動所穢六畜棲欄穢養房中  
床帳多掛胡妥以酒灑之常燒乳香降真香使榮衛得香運行  
甚速洒掃房舍潔淨若不防避如法使欲出者不出已出者斑



爛成片甚者瘡黑陷伏加以臭爛痛如刀割悶亂死者多矣

出溼而朝夕啼哭

五臟平和則精神安靜有病則不然痘瘡乃五臟蘊毒發作之時朝夕啼哭當察其毒氣在表在裏若虛甚當隨證調治使氣血流通神守清爽昧者或以爲心熱爲腹疼妄亂出藥以致冷熱偏勝變生他證可不審乎

遍身青紫紋

痘瘡之出乃熱邪內外蒸發熱毒方運天氣暴寒折之外寒與內熱相拒而不得入內熱爲外寒所閉而不能出毒氣壅於肌皮其痘如痣點或青或紫俗云鬼捺青或年壯肌肉厚密亦有此證

面青為逆

上下治未病心主血痘以血為主面赤身熱煩躁者乃心之證形為順今面反青色乃色病不相應也其證為逆更當察其外證預防之熱者必生風虛者必下利且消風散虛者下利宜理中湯異功散

膿汁不乾

出得太盛膿水不乾粘致惹膚疼痛濕爛不能轉動且白龍散敗草散

陷伏倒靨黑陷

外感風寒不能出者謂之倒靨

胡氏曰若外感風寒肌肉閉塞血凝不行坐有身寒四肢微厥

紅點不長或青紫紋或黑色宜溫肌發散寒邪使毒氣流行其  
瘡自出

楊氏曰或因煩燥惡熱掀衣被為風邪所傷或驚脫取涼為  
風冷所襲或值天寒惡冷氣所侵輕則其壯如赭色紅而不發  
重則陷如石曰色白而冰硬治法當溫血氣散寒邪宜不換金  
正氣散加川芎惡寒加桂紫蘇

穢氣觸忤而成倒靨

胡氏曰痘瘡初出未收被父母房事月嫁等穢氣衝觸欲出者  
使之不出已出者痘爛成疔盛者瘡焦陷伏加以臭爛痛如刀  
刺悶亂而死急宜黃解毒之常以胡荽酒熨床帳仍掛胡荽以辟  
惡毒令辟穢丹烈火焚之

瘡黑有逆順

黑瘡陷伏本是逆證亦有順者瘡雖黑陷而忽瀉膿血加死能食者為順此必舊服脾藥脾強可以勝腎脾土不衰毒入腹而瀉出脾病則五臟危今脾土既盛他證無慮矣所謂逆者脾土虛不能制腎水乳食不化脾虛則四臟危矣

不結痂疔

血疔既成常結膿巢痂疔而愈痂死者瘡醫是也當結而不結乃內外熱極毒氣散漫無陰氣以斂之古方用宣風散導之磨生犀汁解之或用沙糖滾白湯調化服隨手而愈用沙糖不可大早以瘡入目入血疔起脹毒氣弥盛而不結也

瘡癰腫硬

痘瘡既平失爲解利餘毒太盛內不能入於臟腑外不能泄於皮膚聚而不散輕則結於瘡癰重則頭項胸背手足肢節亦腫而成癰生消毒飲

### 痘瘡入目

痘瘡毒氣攻目成翳治法活血解毒而已活血不致於熱解毒不致於冷用藥平和其證自退或誤用熱藥反所益疾過用冷藥反以傷脾也

### 有正痘有膚瘡

臟腑蘊熱不同表裏受證各異六腑屬陽有熱則易出一出偏於肌皮之上如痲瘡泡子見而便沒受毒淺也此名膚瘡俗曰麻子五臟屬陰有熱則難出在肌肉之間受毒深也此爲痘瘡

內虛不能出者謂之陷伏

胡氏曰若胃虛不能副榮衛必出而復沒瘡點白色或黑其人必不能食大便自利或吐或厥急以救裏溫而出之

楊氏曰痘瘡初出或因臟腑虛怯自然吐痢或未發之前候服涼藥以致泄痢其瘡不發形見小點淡紅而白或白而微黃不能起脹治法先正吐痢後以溫和之藥發之宜理中湯水香散異功散豆蔻圓

熱毒入裏重陷

胡氏曰痘瘡不透心煩狂燥氣喘妄言如見鬼神大小便秘渴而能食毒氣盛入裏此證為實及血疱六七日當結膿窠痂死而不結乃毒氣彌盛心火炎燥宜猪尾膏曾用一服則結痂死神

異奇速獨方 篇一後醫士詳之

黑醫而發寒

痘瘡黑醫其證有四所因不同用藥亦異一者感冒風寒宜溫散之二者毒氣太盛宜解毒利小便三者內虛無陽急宜溫裏四者穢毒觸忤宜重解之大抵黑醫發寒者爲重不發寒者爲輕發寒之證乃脾弱爲腎水所勝用百祥圓瀉膀胱孰若先溫脾土救胃氣以制腎水決無黑陷發寒之證

變壞歸腎黑陷

胡氏曰由蘊生至重內外蘊結而不結加花大小便秘腹脹蒼黑紫而乾陷錢氏以百祥圓瀉膀胱經毒服之身溫飲飲水者可治加以寒戰身冷汗出耳尻反熱者死獨立

大抵熱而便閉者必膚癢又熱難出必痘瘡

湯氏曰小兒痘瘡其證與傷寒相似先當發表使毒氣出腑則成細癩若失表則熱毒在臟則成痘瘡

楊氏曰由風邪夾熱起於湊理皮膚不腫不疼發而搔痒謂之癩癧此風熱在表之浮淺也亦有寒暑濕之氣行焉風熱在表天時炎暄燥氣乘之則為赤癩風熱在表天時寒涼冷氣折之則成白癩赤者遇青涼而後滅白者遇溫熱而後消又有浴後感受汗出解脫得之者隱隱微紅似赤似白癢澀肌肉之間而四脉重者此風熱夾濕當知寒暑濕之所由生不可一槩用而熱等藥便痰嗽嘔喘雜證交攻則癩癧而變為痘瘡矣

餘毒作嘔吐



脾胃主納而不主出大小腸主出而不主納痘疹嘔吐餘毒在胃也病有冷熱之不同藥有溫涼之各異醫士明之熱吐者心煩而渴食乳甚急數滿膈中微又吐出如針其人必面赤手足心熱居處喜冷宜去桂五苓散加橘皮主薑汁服冷吐者面色青白乳食隨吐不化大小便自利宜理中湯加薑散大抵病後餘毒多是熱證其間冷證十有一二

吐瀉不食

吐瀉有冷熱之不同不食有虛實之各異吐而不渴瀉而手足冷面色青白此冷證也五苓散治之既吐而且渴瀉而手足心熱面赤身熱喜居冷處此熱證也五苓散竹葉石膏湯其治之脾胃虛弱精神慢而不食者為虛當溫養之理中



紅癰或生癰癰此三等不同何故俱顯上證而後乃出蓋已上  
諸證皆太陽寒水起於右腎之下煎熱左腎是太陽膀胱寒水  
夾脊逆流上頭下額達手太陽丙火不能傳導達於面土故顯  
是證蓋壬寒水尅丙丁熱火故也諸般證皆從寒水逆流而作  
也醫士當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名膀胱亦名  
命門主男子藏精施化婦人繫胞有孕俱爲生死之源非五行  
也非水亦非火此陰陽之異名也象坤土之生萬物也夫人始  
感血海始靜一日二日精緣其血則爲男子三日四日五日血  
氣已旺精不勝血則爲女子乃二物相搏長先身生謂之神又  
謂之精道釋二門謂之本來面目是也其子在腹中十月之間  
隨母呼吸呼吸亦吸者陽氣也而生動作益精氣神則食

血清則飲血而日長皮肉筋骨血脉形氣俱足十月降生  
口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻  
于一隅伏而不發直至因內傷乳食濕熱之氣下溜合於腎中  
三火交攻營氣不從逆於肉裏歸于陽明故三番癰始顯之證  
皆足太陽于膀胱起小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉裏  
熱化爲膿二火熾盛反傷寒水遍身俱出此理皆足太陽傳變  
中來也當外發寒邪便令消散內瀰二火不令交攻其中今濕  
上歸復其本位可一二服立止仍令小兒已後再無三番癰出  
之患此內外經之法詳矣

癰疽勸戒論


多有人不會醫小兒痘瘡今具捷法如信用之者但保十全醫

醫至當先說病源然後診視庶無差錯言之幾何人哉  
痘瘡既分曉却有二證一曰好證二曰常證三曰危證  
一好證若乳食與大便如常或一日一次或兩日一次通者此  
爲好證不須服藥亦自愈如要服藥只平和不冷不熱即安  
二常證出痘瘡而大便秘小便赤者此是常證

三危證出痘瘡而腹瀉不已及小便青者此爲危證用生料理  
中湯四味加藿香葉數片入米三十粒濃煎服人家出痘瘡爲  
父母者切忌色慾不得熬油不得出厠仍須忌食一切毒物

陳氏形證圖

痘瘡 日一日始見微微欲出如粟米  
 水珠光澤明淨者極佳  
 未入或如豆大似



四日五日痘瘡大小不一等根窠紅光澤明淨者輕如稠蜜頂陷灰白色或瀉瀉者重

六日七日痘瘡肥紅光澤者輕如身溫氣促口乾腹脹足指冷者重

八日九日痘瘡長足肥滿蒼蠟已者輕如寒戰悶亂腹脹煩渴

交牙者至重

十日全十日瘡瘡盡癩癩欲結而愈

今而虛

身冷

自利

吐瀉

脾胃虛冷

乳食不進

精神慢

自汗

乳食不化

雙眼

口氣冷

至初心慙然

廣



治法冷則溫之

熱而實

身熱

大便秘

小便赤色 脈大

喜居冷處

手足心熱

吐衄而渴

口氣熱

治法熱則涼之

輕者

出瘡作三次出

大小不一等

頭面稀少

眼中無

根集紅

肥滿光澤

裏外肥紅

痘出稀少

乳食

如常

色澤發於皮膚

重者

一齊并出

密如蠶種

稠密無縫

五內七孔回目

皆有

吐衄

瘡灰如色

身溫

脈脹

頭溫足冷外

白內黑大頂

瘡內黑點如針孔

或如茱萸子重

半輕半重

外黑內赤

痘瘡夾痧

輕變重

犯房室

不忌口

月風寒

食生冷

飲冷水

食小蜜

過飽食飽

飲酒多

服熱藥

誤服升麻湯大黃白芍等涼藥

月婦外人穢解

痘已出要汗妄下

信巫不信醫

不食血肉

担廁糞六玄里棲欄

重變輕

避風寒

常和暖

大便秘

不燥渴

忌外人

萬物以禁

大抵天地萬物遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生

成者也。今瘡疹之病，臟腑調和則血氣充實，自然易出，易出易靨，蓋因外常和暖，內無寒氣之所由也。

### 表裏俱實

小兒瘡疹始出一日至十日，渾身壯熱，能食，大便黃稠，小便清利，乳食如常，其瘡必光澤，必起發，必肥滿，必易靨，根窠紅，是表裏俱實而不致損傷也。

### 表裏俱虛

小兒痘瘡已出未愈之間，其瘡不赤，澤不起發，根窠不紅，或腹脹或瀉，渴或氣促，是表裏俱虛也。當十二味異功散七味肉苳蔻圓治之，以助五臟六腑表裏之氣。

### 不宜用升麻葛根湯

小兒如痘癰始出一日至五七日之間雖身熱或腹脹足稍冷者不宜升麻葛根湯或身熱瀉渴者亦不宜升麻葛根湯或身熱驚悸腹脹者則不宜升麻葛根湯或身熱汗出者不宜升麻葛根湯已上四證宜服一味木香湯治之

### 戒用升麻葛根湯

道有經有權兵有正有奇病有常有無變者有可必變者不可必古人用升麻之意治痘瘡之常不治痘瘡之變常有未見痘點之先已結痂死之後始發熱者常也若夫痘點既見及正出未收其證不一曾無定論可拘如傷寒傳變不一也安可執一藥以應無窮之變哉且升麻葛根湯藥性大寒不過涼肌解表而已今昧者不能究此既出未收之際同令服餌及喜受虛弱者

緊用之致令肌寒表弱陷伏危殆醫士戒之

錢氏曰古方用升麻葛根湯治痘瘡已發未發皆可服世習以爲常不問虛實冷熱正出未收以爲常用之劑蓋升麻葛根湯其性寒涼若小兒內虛胃弱則以水濟水虧損胃氣水凝血脈使已出者不能起脹未出者陷伏不起或出而復陷傷生之命可不慎乎

陳氏曰痘瘡首尾皆不可用升麻葛根湯切宜戒之

小兒出痘瘡時方言先用四味升麻葛根湯涼劑又方用五苓散煮爛食之豆性亦涼須看虛實大便不通或大小便赤黃色可用大小便青白色或泄瀉二方切不可服

宜和之過

小兒痘瘡雖出不快皆言毒氣壅盛其謂其熱以藥宜利解散致令臟腑受冷禁衛漸滯則氣血不能衛膚皮膚肌肉其瘡不得起發不得克滿不得結實不能成痂故多痒癢煩燥渴而死皆因宜利解散之過也縱得其生而必罕矣

### 瓜果冷物

小兒瘡發熱口熱乾燥煩渴不止者切不可與冷蜜红柿西瓜等冷物食之又不可妄投清涼飲消毒飲等藥恐冷氣內攻濕損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙難治咬牙者齒槁也乃血氣不禁也不可妄作熱治之

### 泄瀉

小兒瘡瘳若如瀉水穀或瀉白色或瀉淡黃色者宜十一味木

香散七味葶藶圓治之瀉止者住服不止者多服

瀉脫

小兒瘡癰若瀉類多津液內耗血氣不榮其瘡雖是起發亦不能醫也如身溫腹脹喘牙喘渴者難治綠水穀去多津液枯竭而欲飲水不止者瀉散真氣故多死矣速與十一味木香散急救之如不愈十二味異功散治之

潤腸

小兒瘡癰如四五日不大便者可用肥嫩猪腰一塊以淡白水浸火煮軟熟取出切如豆大或皂子大與兒食之令臟腑滋潤使瘡疔易落百無滯礙切不可妄投宣瀉藥恐內虛瘡毒入於裏傷兒真氣

大便熱結

小兒瘡癰六七日身壯熱不大使其脈緊盛宜三味消毒飲服微得利即愈

禁忌

小兒神氣軟弱瘡癰初出二三日至十二口當忌外人恐有卒暴風寒穢惡之氣觸兒瘡癰

寒熱

黃帝問曰飲有陰陽何也好飲冷者冰雪不知寒好飲熱者沸湯不知熱岐伯對曰陽盛陰虛飲冷不知寒陰盛陽虛飲湯不知熱治之何如故陽盛則補陰十一味木香散加丁香桂陰盛陽虛十二味異功散加木香當歸每一兩藥共加一錢



小兒瘡疹若身反發熱煩渴者宜六味人參麥門冬散治如不愈服七味人參白朮散治

小兒痘瘡欲靨已靨之間忽不能靨腹脹煩渴不可與水蜜若與者轉渴而死宜十一味木香散治

小兒痘瘡欲靨已靨之間頭溫足指冷或腹脹瀉渴氣促者不可與水蜜若與者即死急宜十二味異功散治

小兒痘瘡十一日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧卧則硬氣煩渴嚙牙急服十二味異功散更加水香當歸以救陰陽表裏若與水蜜西瓜等冷物者殺之十八速

文中納忠誠告

賢明君子當且詳審

十二日十三日瘡加已落其瘡癰猶黯然或凸肌肉尚嫩不

可燥浴亦不宜食炙博物乃 不宜食五辛五味并毒之物恐熱  
毒薰於肝肺眼目多生翳障 若不依此禁食為兒終身之患宜  
三味穀精草散治

若痘瘡磨已其痴欲落不落煩渴不止切不可用藥蜜而爪紅  
柿令物等食之若與之轉生熱渴或頭渴或或弱脹或時瀉  
或咬牙以致難愈宜十一味水煎服

壯熱不除

若身壯熱經日不除則無他證宜三味柴胡麥門冬散治熱退  
若住服如不愈服七味人參白朮散

深嗜身熱

若涕唾稠粘身熱羸弱新熱大便秘如常小便黃赤宜三味人  
參白朮散

參清膈散  
治人食不化  
治

風熱咳嗽

若風熱咳嗽咽腫不利宜三  
人參白朮散治

風熱咳嗽

若痰實壯熱口中煩渴大便堅者宜則除痰散  
湯治

小渴

若小渴者六味人參重和散如不愈者服七味人參白朮散  
治

大渴

若身熱大渴者宜十味人參白朮散如不愈者服十一味木香散治

渴

若腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身溫渴者或身熱面皛白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不已者已上九證即非熱乃脾胃肌肉虛津液衰少故也宜十一味木香散如不愈者更加丁香桂多煎服丁香以裏桂發表其表裏俱實而瘡不致痒渴而死矣

身生癰腫

小兒痘瘡首尾不宜與水寒至候與之瘡腐之後其痂遲若或身生癰腫若鍼之成疳蝕瘡血水不絕其則厚黃唇白以致難

愈者何也蓋脾屬土外主一身之肌肉抵緣飲水過多溫損脾胃傳於肌肉其脾胃肌肉虛則津液衰少津液衰則榮衛澀滯榮衛澀滯則氣血不能周流凝結不散故瘡痂遲落而身生腫腫也

### 疔蝕瘡毒

小兒瘡癤已醫不愈之間五臟未實肌肉尚虛血氣未得平復忽被風邪搏於膏腠之間則津液澀滯故成疔蝕瘡也宜雄黃散綿繭散治之而不愈者潰骨傷筋以致殺人

### 疔蝕瘡毒

小兒疔蝕瘡毒之病俗言瘡子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作黃發於皮膚狀如蚊蚤所咬故赤疔遍身也

凡發赤痘者十生一死發黑痘者十死一生

痘毒生熱

痘毒多生熱 攻衝 氣血虛 黃肝睛上膜 入肺嗽難除

傳腎瘡猶黑 傳脾 吐有餘 傳心驚恍惚 眠卧不能舒

痘毒攻肝

熱毒攻肝膽 羞明眼 溼昏 赤筋生魚皮 白翳結癰痕

瘡痘如珠

瘡痘如珠 肥紅正行 瘡毒石解利 有惡毒之

痘毒未盡

痘毒未能盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡 瘡毒未盡

痘後結癰

痘後結癰疽

肌膚熱未除

瘡癰

瘡癰

嘔吐無歡意

驚眠不自如

腸鳴

腸鳴

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘毒攻胃

痘後牙疳

痘後亡津液

主痘餘毒斷

侵唇連口鼻

損肉又傷筋

瘡後肚疼

發熱肚中痛

瘡瘡腹內攻

出多防不潰

出少更防癰

瘡痘便難

毒熱交攻 尿難養不通 數日頻鼻衄 或瀉又腸風

瘡痘逆候 不治

吐瀉瘡瘡逆 便難膠亦危 黧黑因走氣 唇紫血之衰

瘡痘變證 不治

喉物時時噎 喉中拾錯聲 痰涎有汗 腹脹氣虛鳴

瘡痘青黑 不治

瘡痘欲出先青黑 半在皮膚紫黑色 昏沉默默又抽寒

困頓其具都不食 心煩涎盛頻嘔頻 氣熱喘急離極

渴吐甚牙時發顫 毒嘔咽喉熱而寒

全生方云一病未已一病復生二行勝後相乘其人必死

痘瘡五不治



痒塌寒戰咬牙渴不止

此皆寒色喘渴不寧

灰白色陷頂腹脹喘渴

此皆溫足公認亂飲水

咬牙氣促瀉瀉煩渴俱難治

一切脉豆變作死候

通身忽生起如雞子大腫毒黑

為發喘

忽自瀉下鮮血并黑豆如死雞

紅色

唇青黑縮咽喉腫閉口舌喉生

黑色

忽被外風手足搐搦直視口吐

涎沫不惺

肚脹如鼓氣喘煩燥大熱發渴

并出血

瘡子紫黑色瘡中心先陷沒後

不出

瘡子出後通身氣腫如冬瓜氣

急促

面耳口鼻俱黑四肢逆冷項軟

手足身軀俱冷如冰腎中黑縮

被外風面色青黑手足搐作

被外風胃悶喉中涎咽目閉多

一向作大熱煩燥喘急服諸藥

消毒救苦湯 治嬰孩小兒經

稀者再不生癰立方隨四時

麻黃根

羌活

防風

細辛

地黃

蘇木

白朮

橘皮

川芎

藁本

紫胡

黃芩

葛根去皮

蒼朮

米泔水浸炒各二分

黃連

古法酒炒

當歸

去蘆各三分

紅花

連翹

吳茱萸

甘草

生各半錢

黃連酒浸

升麻

煨各五分

右咬咀水煎食前熱服

小兒出痘瘡時用五色豆煮爛只齊出

赤豆

黑豆

白豆

藜豆

黃豆

論用五色豆煮爛食豆性涼須看虛實大便不通或大小便赤黃色可用大小便青白色或泄瀉切不可服

防礙入目

瘡瘡護眼人多用胭脂金目四邊仍以黃蘗膏塗之

黃蘗膏 治嬰孩小兒瘡癰正出用此藥塗而後用胡荽酒

黃蘗 五錢

新葦豆 五錢半 甘草 生二兩

右爲極細末用生油調如膏從耳前至眼匡唇口並厚塗月  
三五次若早用痘瘡不生頭面用之遲縱出亦稀

胡荽酒防諸般惡氣用胡荽二兩切細入好酒三盞煎令沸沃  
胡荽便以物合定不令氣出候冷出滓微微再吸一兩口  
噴從項已下噴背膂及兩足心腹令遍勿噴面上頭病人  
左右常令有胡荽即能辟去汗氣瘡癰出快忌外人穢觸  
之物雖不可受風冷然亦不可擁逼常令衣服得中并虛  
涼處坐卧

楊氏曰胡荽酒噴鼻瘡便出快也其兒虛弱及天氣陰寒則可用之若春夏晴熱陽氣發越之時及兒壯實加以酒麴助虐以大益火胃中熱熾毒血蓄聚變成魚腦急煎麥酒湯入猪尾血和龍腦服

薰解穢惡

阮氏辟穢丹

蒼朮

細辛

甘松

川芎

乳香

降真

右爲末用水圓引火焚解穢氣

小兒痘瘡房室中宜時時燒太乙香朮末以辟穢氣不宜燒乳檀香真龍麝乳白礬等香煎燭肉油急避切忌之

疳瘡不透乾黑危困用紫葳子右爲細末紫葳酒煎調服食前  
新生小兒上三日將木身兒脫下臍帶燒灰研極細末用親母  
乳汁調灌服不拘時候不生痘瘡

芥子膏 治嬰孩小兒瘡痘不入服

白芥子

右爲極細末用水調傅足心引毒歸下

仙退散 治嬰孩小兒疳瘡入眼成翳

蟬蛻

右爲極細末用羊肝煎湯調化食後服

十味水香散 治嬰孩小兒性溫平能和表裏通行津液清

上實下扶陰助陽之藥腹脹瀉渴如神

木香

大腹皮

桂心去心

前胡去蘆

橘紅去白

丁香

訶梨勒煨去核

人參去蘆

半夏麴炒

赤茯苓上皮

甘草炙各三錢

右爲剉散用水一小鍾生薑三片同煎去滓食前溫服量兒大小以意加減服藥後忌蜜水

十二味異功散 治嬰孩小兒能除風寒溫痺調和陰陽滋養氣血使瘡瘡易出易靨蓋因不致痒塌文中代代世醫不敢妄處藥餌思人身難得因果非輕

木香

當歸去蘆焙

人參去蘆

橘紅去白

厚朴薑汁製炒 丁香

肉豆蔻

麵裹

去油各二錢半

桂去皮

茯苓

去皮

白朮

各二錢

半夏  
麴炒

附子

炮去甲以尖各一錢半有熱不用

右為剉散用水一小鍾生薑三片東五箇去核同煎去滓食

前熱服三歲兒作三次服五歲兒作二次服一週二歲兒作

五次服病有大小以意加減累經效驗忌食水

七味肉苳蔻圓

木香

縮砂

去殼各三錢

白龍骨

煨

訶梨勒

煨去核

肉苳蔻

麴裹煨去油各五錢

赤石脂

白礬

煨各七錢半

右為極細末糯糊圓如黍米大用米飲食前服一週兒服三



十圓或五十圓三歲兒服一日圓瀉不止異功散同服瀉止

住服若不止瀉多服

人參麥門冬散

麥門冬去心

人參去蘆

甘草炙

陳皮去白

厚朴通草汁製炒

白朮各五錢

右以咀用水煎不拘時候服

人參清腦散

人參去蘆

柴胡去蘆

羌活去蘆

芍藥炒

知母

桑根白皮炙

白朮

黃耆炙

紫苑去土

地骨皮

茯苓去皮

石

滑石 各七錢半

右劉散用水煎食遠溫服

射干鼠粘子湯

鼠粘子 炒一兩 甘草 炙

升麻 煨

射干 各二錢半

右劉散用水煎不拘時候服

穀精散 治嬰孩小兒痘瘡已靨膿自發膜速障障人癰滋  
淚出久而不退

穀精草 五錢 蛤粉 生一兩

右為極細末獺豬肝一葉用竹刀批作片子搗藥在內用草  
繩縛定以菴蓋內貯水慢火煮熟令兒食不拘時候

前胡枳殼湯

前胡去蘆

赤茯苓去皮

枳殼去穰麥麩炒

甘草炙各二分錢

大黃酒洗裏裹煙一錢

右以咀用水煎去盡食前服如身溫脉微并瀉者不可服

四聖散 治嬰孩小兒痘瘡出不快倒靨小便赤色餘熱不除

紫草

木通去節

甘草炙

黃耆炙

枳殼去穰麥麩炒各一錢

右以咀用水煎去滓不拘時候服

紫草散 治嬰孩小兒痘疹瘡黑陷

紫草

甘草

黃耆炙

糯米各一錢半

右咬咀用水煎去滓不拘時候服

生地黃散 治嬰孩小兒疳積身熱口乾咳嗽心煩

生地黃 五錢 麥門冬 七錢 欬冬花 五錢

杏仁 二錢 炙 陳皮 各三錢 甘草 炙 二錢

右剉散用水煎去滓不拘時候服

桔梗甘草防風湯

桔梗 去蘊炒 甘草 炙 防風 去蘊炒

右咬咀用水煎去滓不拘時候服

麥湯散 治嬰孩小兒水瀉

地骨皮 炒 半斤 麻黃 去蘊 一分 甘草 炙 半斤

滑石 水飛 半斤 人參 去蘊 知母

甜葶藶

紙裹煨

卷活

上各一錢

右剉散用水煎入小麥七粒同煎不拘時候服

身痒

氣血不足其痒爲虛不進乳食胃主肌肉調脾進食活血氣其瘡不致痒塌

二物湯

蟬蛻

去足洗淨二十一枚

甘草炙一錢

右以咀用酒煎去滓食遠服

阮氏敗草散

屋爛草

乃蓋屋多生爛草如無益諸爛草亦可

右其草多經霜雪雨露感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不

能盡述一味不以多少晒乾或焙乾為極細末乾則熱時將  
渾身瘡破膿水不絕粘貼衣裳難以坐卧可用二三升攤展  
上令兒坐卧仍用十一味水香散如丁香桂煎服  
王充白龍散

黃牛糞晒乾火煨過成灰取中白者用

右為極細末用綿包撲之

百草膏

治嬰孩小兒痘風瘡

乾羊糞

燒灰清油調傳

滅癩散

治嬰孩小兒痘瘡癰愈毒氣尚未全散瘡如雖落其

癰疽點或凹或凸

韶粉一兩

輕粉一字

右研極細末煉豬脂油調傳

百花膏 治嬰孩小兒痘瘡難升心誤抓成瘡及瘡疔欲落不落

蜜

用好白蜜

右塗瘡上其疔易落自無紫黑瘰癧痕

綿繭散 治嬰孩小兒身腫及肢節上生疔腫瘡膿水不絕

出錢綿繭

右不拘多少用生白礬槌碎塞入綿繭內令滿以炭火燒化白礬汁盡取出為極細末用乾貼疔瘡口內

猪尾膏

治嬰孩小兒瘡倒靨用猪尾尖刺血亦好

龍腦

一錢

石細研旋滴猪心血圓如薤葉大用紫葢散乃研  
潘氏曰此方與靈苑方同須更一身痘出後要  
橫矣

四聖丹 治嬰孩小兒瘰疬

珍珠七粒或三五粒研

晚豆四十九粒

頭髮不拘多少燒灰

凡為極細末用搽面臍脂調成膏子貼於瘰疬口將  
藥點入疔內即時大小瘰皆變為膿血人受小兒出痘瘡  
有灰頂者十死八九為解人不識此方者必不曉治法故  
也今要於瘰疬黑色中認出有瘰疬大者貼之瘰疬自  
疔又有瘰疬鼻氣者為疔依方治之救人多矣



本草綱目卷之

卷之

四物湯 治嬰孩小兒時行痘疹發熱之症服之即愈  
消瘡癰餘毒大凡疥癩瘡不瘡者服此藥能活血調順  
瘡癰無如此藥活人書曰黃藥一味能治一切瘡不快以此  
四物湯誠瘡痘之仙藥也 一六加黃藥丸

白芍藥

川芎

黃藥

當歸

右咬咀用一小盞煎去滓服不拘時服此是婦人藥而  
痢入櫻栗殼炒同煎

天花散 治嬰孩小兒瘡痘失音

天竺粉

桔梗

茯苓

訶子

金魚

甘草

右爲極細末用水調在碗內小竹七葉小荆芥七葉縛作一束點火在碗內煎臨睡服

小兒明堂灸經

夫小兒之患詳悉幽玄然而抱疾且不能言也或即胎中受病或是生後傷風動發無時寒溫各異且據諸家方論醫藥多門藥既無痊全憑灸法散在諸經文繁至甚其說不同既點穴以差訛則治病全然紕繆按諸家明堂之內精選到小兒應驗七十餘穴並是曾經使用累驗神效今錄于後

天醫取師療病吉日

正月卯日

二月寅日

三月丑日

四月子日

五月亥日

六月戌日

七月酉日

八月申日

九月未日

十月午日

十一月巳日

十二月辰日

點灸法

凡點灸時須得身軀平直四肢無令拳縮坐點無令僂仰立點無令傾側灸時孔穴不正無益於事徒燒好肉虛忍痛楚之苦有病先灸於上後灸於下先灸於少後灸於多皆宜審之

下火法

凡下火點灸欲令艾炷根下赤暈廣三分若不三分孔穴不中不合得經絡緣榮衛經脈氣血通流各有所主灸穴不中即火氣不能達達而病未能愈矣

用火法

古家用火灸病忌八般木火切宜避之八木者松木火難盡

病柏木火傷神多汗竹木火傷筋目暗榆木火傷骨失志桑木  
火傷肉肉枯棗木火內傷吐血柘木火大傷氣脉楠木火傷榮  
衛經絡有火珠耀日以艾盛之遂得火出此火灸病爲良凡人  
卒難備矣次有火照耀日以引之便得火出此火亦佳若遇天  
色陰暗遂難得火今即不如無木火也灸人不犯諸忌無云凡  
病清油點燈燈上燒艾炷點艾是也無滋潤灸後至瘡俞已安  
且無疼痛用蠟燭更佳諸蕃部落知此八木火之忌用銅鐵鑿  
砢石得火出以艾引之遂乃着灸

人神所在不宜針灸

一日在大指

二日在外踝

三日在股內

四日在腰間

五日在口舌

六日在兩手

七日在內踝

八日在足

九日在尻

十日在腰背

十一日在臍

十二日在髮際

十三日在牙齒

十四日在胃管

十五日在遍身

十六日在胃

十七日在氣衝

十八日在股肉

十九日在足

二十日在內踝

二十一日在手小指

二十二日在外踝

二十三日在肝及足二十四日在手陽明

二十六日在背

二十七日在膝

二十八日在陰

二十九日在膝脛

三十日在足趺

此日忌灸

十二時不宜灸

子時在踝

丑時在頭

寅時在耳

卯時在面

午時在胸

未時在腹

申時在心

酉時在背

辰時在項

巳時在乳

戌時在腰

亥時在股

士部人神不宜灸

建日在足禁補時

除日在眼禁日入

滿日在腹禁黃昏

平日在背禁入定

定日在心禁夜半

執日在手禁雞鳴

破日在手禁平日

危日在鼻禁日出

成日在唇禁食時

收日在頭禁雨中

開日在耳禁午時

閉日在目禁日跌

每月忌口不宜灸出血

正月丑日

二月未日

三月寅日

四月申日

五月卯日

六月酉日

七月辰日

八月戌日

九月巳日

十月亥日

十一月午日

十二月子日

新忌傍通不宜灸

正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一

月 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥

月 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌

月 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌

月 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌

月 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌

月 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌 戌

四季人神不宜灸

春在左脇 秋在右脇 夏在臍 冬在腰 男忌除日 女

忌破日

貼灸瘡去

春取柳飛花如鵝毛者夏用竹膜秋用新綠冬用兔毛取

白紙懸者猶見腹上者更佳

# 正人形第一圖





小兒驚癇者先驚悸啼叫後乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脉炷如小麥大

小兒風癇者先屈手指如數物乃發也灸鼻柱上髮際宛宛中三壯炷如小麥大

小兒緩驚風灸尺澤各一壯在肘下橫文約上動脉中炷如小麥大

小兒二三歲忽發兩眼大小皆俱赤灸手大指次指間後一寸五分陷者中各三壯炷如小麥大

小兒顙門不合灸臍上臍下各五分二穴各三壯灸瘡未發顙門先合炷如小麥大

小兒夜啼者上燈啼雞鳴止者灸中指甲後一分中衝一壯炷

正人形第二圖



小兒喉中鳴嚕乳不利灸璇璣一穴三壯在天突下一寸陷者中炷如小麥大

癰病者小兒惡疾也呼吸之間不及求師致困者不少諸國無良醫枉死者半小兒諸癰病如口瘡吐沫灸巨闕穴三壯在鳩下一寸陷者中炷如小麥大

小兒睡中驚目不合灸屈肘橫紋中上三分各一壯炷如小麥大

小兒口有瘡鍾斷鼻穢氣衝入灸落唇已二穴各一壯在手心中以名指屈指頭勞言者處是也炷如小麥大

小兒雞癰善驚反掣目搖灸手少陰二壯在掌後去腕半寸炷如小麥大

小兒體久不愈者及足大指次指外開陷者中為一壯旺如小  
 麥大肉瘡尤也

# 正人形第三圖



小兒身強角弓反張灸鼻上入髮際三分三壯灸大椎下節間三壯炷如小麥大

小兒龜胸緣肺熱脹滿攻胸膈所生又緣乳母食熱麪五辛轉更胸起高也灸膈乳前各一寸半上兩行三骨驢間六處各三壯炷如小麥大春夏從下秋冬從上灸下若不依此法灸十患不愈一二也

小兒疳眼灸食三三各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷者中灸三壯如小麥大

小兒秋深冷痢不止者灸臍下一寸二寸間動脈中炷如小麥大

# 正人形集四圖

肺心三俞

鬼祿穴

膝下分水穴

中脘穴

脊背腧穴



小兒驚癇灸鬼祿穴在下唇內中央弦上炷如小麥六綱刀決  
斷更佳

小兒木氣盡腫及腹大灸臍上一寸三壯炷如小麥大分水完  
小兒熱毒風盛眼瞤赤痛灸手中指末節頭三壯名拳尖也炷  
如小麥大

小兒龜背生時被寒風拍着脊骨因達於髓也所致如是灸  
肺俞心俞膈俞各三壯炷如小麥大

肺俞在三椎下兩傍各一寸半

心俞在五椎下兩傍各一寸半

膈俞在七椎下兩傍各一寸

小兒臍腫灸腰對臍骨節間炷如小麥大

# 正人形第五圖





小兒急驚風灸前項一穴二壯在百會前一寸若不愈須灸兩  
眉頭入鼻下人中一穴炷如小麥大

小兒但是風癇諸般醫治不差灸耳上入髮際一寸五分豎而  
取之蠲谷穴也

小兒嘔吐奶汁灸中庭一穴一壯在臍中穴下一寸陷者中炷  
如小麥大

小兒目澁怕明狀如青盲灸中渚一穴各一壯在手小指次指  
大節後陷者中炷如小麥大

小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內廉橫大頭白內除  
各一壯炷如小麥大

小兒眼中驚掣灸足大指次指之端去爪甲如韭葉各一壯炷

正人形第六圖



小兒多疳者是腦風被風拍着及肺寒也灸額會一穴二壯炷如小麥大在上星上一寸直鼻

小兒急喉痺灸天突穴一壯在歧骨結喉上二寸兩骨間炷如小麥大

小兒食癰者先寒熱酒 乃發也灸鳩尾上五分三壯炷如小麥大

小兒牛癰目直視腹脹乃發也灸尾一穴二壯在臍後骨下五分陷者中炷如小麥大

小兒馬癰張口搖頭身反折馬鳴也灸僕心二穴各二壯在足跟骨下白肉際陷者中拱足取之炷如小麥大

小兒陰腫灸內崑崙一穴各三壯主內踝後五分筋骨間陷中

柱如小麥大

背人形第一圖

百會穴

常寧穴

九椎上穴

承懸穴



小兒脫肛瀉血母則瀉肝最痛不可忍者灸百會一穴三壯在頭中心陷者是也炷如小麥大

小兒初生三四日七日內噤不吮奶多啼者是客風中於臍循流至心脾二經遂使舌強唇脛痙攣得斯疾所施方藥不有十全亦大抵以去風無過灸承漿一穴七壯在下唇稜下宛宛中是也次灸頰車一穴各七壯在耳下曲頰骨後炷如雀尿大小兒食時頭痛及五心熱者灸噤噤穴各一壯在第六椎下兩傍各三寸宛宛中炷如小麥大

小兒三五歲兩眼母至春秋忽生白翳遮瞳一疼痛不可忍者灸九椎上一壯炷如小麥大

# 習人第二圖



小兒五六歲不語者心氣不足舌本無力發轉難灸心俞穴三壯炷如小兒人在五椎下兩傍各一寸半陷者

小兒痢下赤白秋末脫肛每圓肛疼不可忍者灸十二椎下節間名接骨穴灸三壯炷如小兒大

黃帝瘰癧小兒疳痢脫肛臁瘦渴飲形容瘦悴諸般醫治不差者灸翠尾骨上三寸骨陷間三壯炷如小兒大

歧伯云無三伏時內用桃柳水浴孩子午正時當日灸之後用清帛子拭盡有似見蟲子隨汗出也此法神效不可量

歧伯灸法小兒脫肛瀉血秋深不較灸龜尾一壯如小兒大脊端窮骨也

# 背人形第三圖





小兒癰瘡入眼灸大炷二炷各一壯在項後第一椎下兩傍各一寸半陷者中炷如小麥六

小兒好癰目不明者翳中俞一炷各一壯在肩甲內無主者二寸陷者中炷如小麥六

小兒主癰目腫吐舌驚也灸第九椎下節間二壯炷如小麥六

小兒飲水不欲面目赤者灸陽剛二穴各一壯在十四椎下兩傍各一寸陷者中炷如小麥六

小兒胎產加偏腫面赤灸囊後縫十字文當上三壯春灸夏較夏灸秋較秋灸冬較冬灸春較炷如小麥六

小兒主瘦食飲少水肌膚多胃俞各一壯在十二椎下兩傍各

一寸  
脂者中炷如小麥大

一日爲醫一日憂

上三科分自傳流

脈通三部循所變

藥施千人悉弗瘳

補瀉先明惟委託

陰陽務在論剛柔

毫釐差失傷生命

潑水焉能再得收

全幼心鑑卷之四終